

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA SANTÉ (DFPSS)
EXAMEN D'ÉTAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES
SESSION ORDINAIRE 2019

Date : 19 Janvier 2020
BLOC MATERNO-INFANTILE

Identification : _____ Code _____

1. Le pédiatre à Marigot pense que Wilson âgé de 4 ans est atteint de coqueluche. Il vous demande de vérifier si le carnet de vaccination est à jour. Vous vous assurez que l'enfant a reçu toutes les doses de :

A. Prevnar	C. Polio orale (VPO)
B. Pentavalent	D. Polio injectable (VPI)

2. Vous effectuez votre rotation au service de pédiatrie, lors de vos observations vous constatez que Bruno, nourrisson de 9 mois, présente un bombement de la fontanelle. La cause la plus probable est une :

A. Méningite	C. Hydrocéphalie
B. Avitaminose A	D. Infection respiratoire

3. Le premier signe de détresse respiratoire chez un nouveau-né de moins de deux semaines se confirme par la présence de :

A. Cyanose	C. Respiration saccadée
B. Respiration bruyante	D. Tirage sternal et intercostal

4. Lors d'une garde au service de maternité, Vous assistez le gynécologue qui fait face à une naissance en état de mort apparente. Selon vous cette situation nécessite de l'équipe en charge :

A. Une Intubation d'emblée	C. Une désobstruction nasale
B. Une succion nasopharyngée	D. Une aspiration endotrachéale

5. La réanimation du nouveau-né vise à assurer :

A. Une bonne conduite alimentaire	C. Une bonne hydratation pour maintenir la température centrale
B. Une ventilation alvéolaire et une hémodynamique correcte	D. Une bonne perméabilité des voies respiratoires et des choanes

6. Vanda est étudiante de 2ème année en sciences infirmières, elle effectue son apprentissage clinique en pédiatrie où vous assurez la supervision comme monitrice de stage. Elle vous interroge sur le cas de Nestor pour lequel le médecin a posé le diagnostic de sténose pylorique. Quel signe clinique a porté le médecin à retenir ce diagnostic ?
- A. Vomissements bilieux
 - B. Vomissements projetiles
 - C. Présence de polyurie
 - D. Présence de selles glaireuses
7. Vous avez la charge d'accueillir les nouveau-nés au service de maternité. Parmi les soins à prodiguer, vous devez effectuer l'insillation de l'Argyrol dans les yeux à la naissance. Ce médicament est dosé à :
- A. 1 %
 - B. 3 %
 - C. 2 %
 - D. 3,5 %
8. Vous êtes responsables de l'éducation des mères à la clinique pédiatrique. A la mère angloise, qui se présente avec un enfant de 13 mois pour lequel le médecin a demandé de réaliser une électrophorèse d'hémoglobine pour investiguer une anémie, vous expliquez que cet examen est important car il permet de :
- A. Distinguer le groupe sanguin de l'enfant
 - B. De classer le type d'hémoglobine de l'enfant
 - C. De contrôler la quantité d'hémoglobine de l'enfant
 - D. De contrôler la réponse au traitement de l'anémie
9. La plus fréquente des infections vaginales est :
- A. La mycose vaginale
 - B. La trichomonase
 - C. La vaginite
 - D. Le chancre vénérien
10. Lors de l'accouchement ce geste chirurgical mineur a pour but d'agrandir l'orifice vulvaire au moment du dégagement permettant une extraction plus rapide de l'enfant et évitant parfois des déchirures périnéales. Il s'agit de :
- A. Episiorrhaphie
 - B. Episiotomie
 - C. Réparation périnéale
 - D. Section césarienne
11. Une accouchée est revue à la maternité au jour 10 du post partum avec un périnée purulent, le premier geste qu'une infirmière devra poser est de :
- A. Renforcer les conseils sur les soins d'hygiène
 - B. Lui administrer des antibiotiques puissants et la renvoyer
 - C. Enlever les points de suture et laver la plaie, antibiothérapie massive
 - D. Réparer le périnée avec un fil absorbable après avoir fait appel au médecin

12. M^{lle} Coralie, infirmière en salle de travail de la maternité d'Isaïe Jeanty, a trois gestantes en travail à évaluer :

1^{re} gestante : douleur abdominale à irradiation lombaire, passage de liquides clairs par le vagin.
2^{me} gestante : Douleur abdominale à irradiation lombaire, passage de liquides sanguinolents par le vagin.
3^{me} gestante : Douleur abdominale à irradiation lombaire, Notions de crises convulsives à plusieurs épisodes, passage de liquides verdâtres par le vagin.
Vous aidez l'infirmière à déterminer le cas prioritaire pour son évaluation clinique. Le cas repéré est la :

- A. 1^{re} gestante
- B. 1^{re} et 2^{me} gestante
- C. 3^{me} gestante
- D. 2^{me} gestante

13. Faites la prévention de la maladie hémolytique périnatale pour cette gestante, G₂P₀A₁EV₀ à 28 semaines de grossesse de Rhésus négatif et dont son mari est de rhésus positif.

- A. Administration de l'antigène anti-D à son mari
- B. Administration de Gamma globuline à la gestante
- C. Dépistage précoce de la mère avant 28 semaines de grossesse
- D. Administration de gamma globuline à 72 h qui suivent la naissance

Vous êtes en infirmière de service dans la localité de Pichet commune de cavillon. On vous amène une Mme Perkin, âgée de 29 ans, avec notions de crises convulsives tonico-cloniques, morsure de la langue, relâchement des sphincters, Révulsions des globes oculaires. Elle a présente les signes vitaux suivants. Les questions 14 à 17.

TA : 16 / 10 Pouls : 100batt/min T° : 37, 6° C Resp : 36mvt/min.

14. Quel serait votre diagnostic pour cette patiente ?

- A. Epilepsie
- B. Pré-éclampsie sévère
- C. Eclampsie sévère
- D. Pré-éclampsie modérée

15. C'est le médicament essentiel que le docteur au chevet de cette gestante, doit prescrire pour aider à la diminution des épisodes de crises convulsives et à la prévention de nouvelles crises qui peuvent causer de grands dommages au niveau des organes nobles : yeux, reins, cœur, cerveau. Lequel ?

- A. MgSO₄
- B. Sulfate de Magnésium
- C. Gluconate de calcium
- D. Bicarbonate de Calcium

16. Utilisé couramment en service de maternité, il possède les effets suivants sauf :
- Analgésique
 - Anticonvulsivant
 - Sédatif
 - Antihypertenseur
17. C'est le signe objectif primordial des effets secondaires qu'il faut surveiller après l'injection de ce médicament.
- Détresse respiratoire
 - Réflexe ostéotendineux
 - Hypotension
 - Anurie
18. Gina est une primipare qui a des seins très petits. Elle s'inquiète au sujet de sa capacité d'allaiter son bébé à la naissance. Elle vous demande des conseils. Votre réponse sera :
- Elle sera probablement incapable d'allaiter son bébé.
 - L'allaitement maternel dépend de l'âge gestationnel du nouveau-né
 - La grosseur des seins n'a aucun rapport avec la capacité de lactation
 - Les mères de petits seins ont habituellement moins de difficultés d'allaiter un bébé
19. Au début du travail, la poche des eaux joue l'un des rôles suivants :
- Rôle dans la contraction de l'orifice cervical
 - Protection du fœtus contre l'émission de méconium
 - Amortissement de la pression intra-utérine sur le fœtus
 - Protection du fœtus contre les variations de TA de la mère
20. Les différents réflexes que présente le bébé à la naissance sont les suivants, excepté :
- Réflexe de Moro
 - Réflexe de succion
 - Réflexes de préhension
 - Réflexe de redressement
21. Une multipare de 38 ans à 34 semaines de gestation présente un hydramnios à l'échographie. Après l'accouchement du nouveau-né, la priorité de l'infirmière dans l'évaluation du bébé est :
- Le diabète Mellitus
 - L'atrésie oesophagienne
 - La malformation rénale
 - La malformation cardiaque
22. Une gestante Rhésus négative non sensibilisée doit recevoir le Rhogam à 28 semaines de gestation. L'infirmière fournira quel renseignement argumentant cette décision ?
- Nécessaire seulement durant la grossesse
 - Prévenir la sensibilisation pour la prochaine grossesse
 - Présente de nombreux effets secondaires comme l'eczéma
 - Sera administré dans un délai d'une semaine après accouchement

23. Lorsqu'un enfant est né, la plus grande préoccupation de l'infirmière est de :

- A. Combattre l'anémie chez cet enfant
- B. Corriger l'hyponatrémie de cet enfant
- C. Corriger l'hypoglycémie chez cet enfant
- D. Combattre l'hypothermie chez cet enfant

Paula vient de mettre au monde son bébé, né à 38 semaines d'aménorrhée. Vous prenez le poids du nouveau-né, il pèse 1kg 980. Les questions 24 et 25 se rapportent à ce cas.

24. Comment qualifiez-vous votre évaluation ? il s'agit d'un :

- A. Prématuro
- B. Nouveau-né hypotrophe
- C. Nouveau-né à terme
- D. Nouveau-né eutrophique

25. Les caractéristiques cliniques présentées par le nouveau-né de Paula sont liées aux causes suivantes sauf :

- A. La multiparité de la mère
- B. Une infection du groupe TORCH
- C. L'hypertension artérielle
- D. L'incompatibilité rhésus

26. Carline est une jeune mère de 27 ans qui nourrit son nouveau-né exclusivement au sein. Elle s'inquiète des effets des médicaments prescrits par le médecin qui pourraient causer des effets pharmacologiques indésirables. Lequel parmi les médicaments suivants n'a aucun effet nocif pour le bébé à une dose appropriée ?

- A. La tétracycline
- B. L'amoxicilline
- C. Le phénobarbital
- D. Le chloramphénicol

27. Quel est le geste à faire après le décollement placentaire ?

- A. Masser la vessie
- B. Masser le fond utérin
- C. Donner du gluconate
- D. Administrer de la Vit K

28. Lors de la démarche d'évaluation d'une gestante, on vous informe que Mme Harrison gestante de 8 mois présente un saignement vaginal, mais elle affirme ne ressentir aucune douleur. Vous jugez que le médecin doit être informé rapidement car il s'agit probablement de :

- A. Rupture utérine
- B. Placenta prævia
- C. Abruptio placentae
- D. Grossesse ectopique

Marjorie vient d'être admise pour crise éclamptique. Sa prise en charge rapide nécessite du MgSO4. Les questions 29 et 30 se rapportent à ce cas :

29. Quel est le geste infirmier à effectuer avant l'administration du produit ?
- A. Donner du diazépam
 - B. Administrer de l'oxygène
 - C. Vérifier l'état psychique de la patiente
 - D. Placer un cathéter pour contrôler la diurèse

30. Marjorie présente rapidement un arrêt cardio-respiratoire après l'administration du sulfate de magnésie. Pour y remédier, l'antidote à lui donner est :
- A. Le pitocin
 - B. Le phénergan
 - C. Le diazépam
 - D. Le gluconate de calcium

Mathilde âgée de 30 ans a accouché à l'HUP. 18 heures après son accouchement, elle présente une tachycardie, une chute de la TA. Les questions 31 à 33 se rapportent à ce cas :

31. Parmi les interventions de l'infirmière, laquelle est prioritaire ?
- A. Appel au médecin
 - B. Administration d'anticoagulant
 - C. Contrôle des signes vitaux
 - D. Installation d'une voie veineuse

32. Selon vous, Mathilde présente les signes de :

- A. D'éclampsie
- B. D'abruptio placentae
- C. De placenta prævia
- D. D'hémorragie du post-partum

33. Parmi les causes d'hémorragie du post-partum, l'infirmière peut évoquer pour Mathilde :

- A. L'éclampsie
- B. L'atonie utérine
- C. L'hypotrophie fœtale
- D. La grossesse ectopique

34. Une patiente est conduite au service de maternité après avoir présenté un malaise à la suite d'un curetage. Lors de son évaluation, le médecin de garde vous dit que la patiente présente des signes d'hypovolémie. Laquelle des manifestations suivantes n'est pas liée à l'hypovolémie ?

- A. Hypotension
- B. Désorientation
- C. Tachycardie
- D. Hyperthermie

- Vous travaillez comme infirmière en service social dans un hôpital communautaire. Lors de la préparation du dossier de Gabie, âgé de 3 ans venue en consultation avec sa mère Gisèle, pour fièvre intermittente, toux, anorexie, vomissements, vous notez que le mari de Gisèle est décédé depuis un an à la suite d'une maladie chronique non suivie médicalement, il présentait un syndrome fièvre récurrent. Gisèle elle-même a eu une candidose orale récemment.
- Les questions 35 et 36 se rapportent à ce cas.
35. Des questions qui suivent, laquelle au moment de l'interrogatoire n'a pas de valeur diagnostique ?
- L'enfant a-t-il été allaité ?
 - L'enfant a-t-il été vacciné ?
 - Qui est le père de Gabie ?
 - Depuis quand Gabie est-elle fébrile ?
36. Le diagnostic présumé dans le cas de Gabie concerne trois des maladies suivantes, excepté :
- Malaria
 - Tuberculose
 - Malnutrition aiguë sévère
 - Syndrome d'immunodéficience acquise
37. Catherine, gestante de 6 mois a bénéficié d'un dépistage VIH lors de sa visite en clinique prénatale. Elle veut savoir s'il est possible que son bébé soit infecté, si son test se révèle positif. L'infirmière lui répond que le risque de transmission mère-enfant est plus élevé s'il n'y a pas de prise en charge :
- Durant toute la grossesse
 - Au cours du premier mois de grossesse
 - Lors de la première tétée
 - Au moment de l'accouchement
38. Il est fortement recommandé aux parturientes de se positionner sur le côté gauche au cours des dernières semaines de grossesse en vue de :
- Faciliter la sortie des urines
 - Favoriser le processus de digestion
 - Faciliter une position confortable du fœtus
 - Prévenir la compression de la veine cave
39. Le bébé de Cécile est nourri exclusivement au lait de mère ; au cours de l'évaluation matinale que vous faites avant l'exat des nouvelles parturientes, vous constatez qu'il présente une teinte ictérique remontant à j2 de vie. Quel est la cause la plus probable selon vous ?
- Ictère physiologique
 - Ictère dû à une infection materno-fœtale
 - Ictère au lait de mère
 - Ictère par incompatibilité rhésus
40. Magda est une jeune parturiente porteuse d'une hémoglobinopathie SS. En salle de travail, le médecin vous demande de vous assurer qu'elle reçoive du liquide et de l'oxygène. Cette démarche est nécessaire pour :
- Stimuler la progression du travail
 - Eviter de recourir à la césarienne
 - Prévenir la déshydratation et l'hypoxie
 - Eliminer le besoin d'administrer des analgésiques

41. La souffrance fœtale aiguë est évoquée en présence :
- A. D'anomalie du placenta
 - B. De travail trop rapide
 - C. De contractions rapprochées
 - D. De liquide amniotique teinté de méconium
42. Une patiente de 32 ans présente une éruption maculopapulaire symétrique et généralisée sur les paumes et les plantes des pieds. Le diagnostic de syphilis est retenu par le médecin. Vous comprenez que la patiente se trouve au stade de :
- A. Syphilis primaire
 - B. Syphilis secondaire
 - C. Syphilis tertiaire latent
 - D. Syphilis tertiaire précoce
43. Gaston âgé de 2 jours, est conduit par sa mère au centre de santé pour distension abdominale. Sa mère précise qu'il n'a pas émis les premières selles. A votre avis, la prise en charge immédiate de ce bébé nécessite la recherche de :
- A. Allergie au lait
 - B. Anus imperforé
 - C. Fistule anorectale
 - D. Infection néonatale
44. L'accouchement est considéré à terme :
- A. Si le terme est compris entre 37 SA et 42 SA révolues
 - B. Si le terme est compris entre 38 SA et 42 SA révolues
 - C. Si le terme est compris entre 37 SA et 40 SA révolues
 - D. Si le terme est compris entre 36 SA et 40 SA révolues
45. Parmi ces paramètres, quels sont ceux qui sont monitorés lors du travail ?
- A. Contractions utérines et BDC Fœtal
 - B. BDC de la mère et émission de méconium
 - C. Température de la mère et PH scalp fœtal
 - D. Rythme cardiaque fœtal et TA de la mère
46. Que recherche-t-on lors de l'évaluation du cordon ombilical ?
- A. L'intégrité du placenta expulsé
 - B. Le diamètre du cordon ombilical
 - C. La longueur du cordon ombilical
 - D. La vérification des vaisseaux ombilicaux

47. La prévention de l'allo-immunisation rhésus chez la parturiente est assurée :
- A. Dans les 8 heures qui suivent le début du travail
 - B. Dans les 72 heures qui suivent l'accouchement
 - C. Chez les femmes rhésus positif si l'enfant est rhésus négatif
 - D. Une semaine avant l'accouchement si risque d'allo immunisation

48. En salle de travail après l'accouchement, parmi les paramètres à surveiller par l'infirmière on retrouve :

- A. Les lochies
- B. La hauteur utérine
- C. L'état des seins
- D. Le signe de Farabeuf

49. Le post partum fait référence à la période comprise entre :

- A. Le travail et l'accouchement
- B. L'accouchement et l'expulsion du placenta
- C. Le premier cri du bébé et l'expulsion du placenta
- D. La délivrance et le retour des premières menstruations

50. Cette procédure est considérée comme étant une méthode de stérilisation :

- E. Mise en place du Diaphragme
- F. Utilisation du Préservatif masculin
- G. Ligature des trompes
- H. Dispositif intra utérin

Gabriel âgé de 21 ans est accompagné au centre de santé pour une anxiété permanente. Lors de son évaluation vous constatez que Gabriel ne perd pas pour autant le contact avec la réalité et utilise même des mécanismes de défense pour justifier son état.

Les questions 1 à 4 se rapportent à ce cas :

1- Ce trouble psychique porte le nom de :

- A. Névrose
- B. Psychose
- C. Etat limite
- D. Schizophrénie

2- La meilleure prise en charge par l'infirmière dans le cas de Gabriel consiste à :

- A. Orienter Gabriel vers un podiatre
- B. Recommander des activités de relaxation
- C. Administrer un Stimulant cérébral immédiat
- D. Suggérer des activités intellectuelles intensives

3- Le médicament idéal à prescrire à Gabriel, est le suivant :

- A. Anti maniaque (Lithium)
- B. Antidépresseur (Zoloft)
- C. Anxiolytique mineur (Valium)
- D. Anxiolytique majeur (Chlorpromazine)

4- Dans le cas de Gabriel, le Rôle de l'infirmière consiste à :

- A. Placer le patient en isolement
- B. Placer le patient dans un endroit calme
- C. Placer le patient dans un endroit bruyant
- D. Placer le patient dans un groupe de psychomotricité

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA SANTÉ (DFPSS) EXAMEN D'ÉTAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES SESSION ORDINAIRE 2019 Date : 19 Janvier 2020 BLOC SANTÉ MENTALE
Identification : _____ Code _____

- 5- Phanord se réveille toutes les nuits avec une sensation de mort imminente, sueurs profuses, sensation d'étouffement et de pression à la poitrine. Son syndrome fait allusion à une :
- A. Dépression
 - B. Schizophrénie
 - C. Crise d'angoisse
 - D. Psychose Maniaco-dépressive
- Madame Sanotte, 42 ans, est une personne très euphorique, exubérante dans ses propos et très exaltée. Elle se fait remarquer par sa tenue criarde, se dit la plus belle et la plus parfaite et déclare être la reine d'Espagne.
- Les questions 6 à 9 se rapportent à ce cas.
- 6- Son diagnostic fait penser à :
- A. Dépression
 - B. Mégalomanie
 - C. Psychose type maniaque
 - D. Psychose Maniaco-dépressive
- 7- Le médicament spécifique à donner dans le cas de Mme Sanotte est le suivant :
- A. Valium
 - B. Lithium
 - C. Zyprexa
 - D. Fluoxétine
- 8- Les prérequis relatifs à l'administration de ce médicament passent par la réalisation de ce test :
- A. Ionogramme sanguin
 - B. Electrocardiogramme
 - C. Contrôle de la lithiémie
 - D. Electroencéphalogramme
- 9- En cas de surdosage des anxiolytiques, on peut observer un des effets secondaires suivant :
- A. Diarrhée
 - B. Crise de panique
 - C. Insuffisance rénale
 - D. Troubles respiratoires
- 10- Christophe est en 4^{ème} année fondamentale et il a déjà fréquenté 4 établissements scolaires. Les parents se décident à le faire évaluer. La psychologue leur explique les résultats obtenus pour son quotient intellectuel. C'est un critère social de débilité légère ou moyenne car Christophe présente un :
- A. Quotient intellectuel situé entre 0 à 30
 - B. Quotient intellectuel situé entre 75 à 80
 - C. Quotient intellectuel situé entre 30 à 50
 - D. Quotient intellectuel situé entre 50 à 75

21- Quel médicament peut aider à corriger ce problème que présente Jacqueline ?

- A. Artane
- B. Trémol
- C. Partane
- D. Biperidem

22- Monette, après s'être fait engueulée par son patron, rentre à la maison. Elle se querelle avec son voisin pur une histoire de stationnement. Quel mécanisme de défense s'agit-il ?

- A. Dénî
- B. Annulation
- C. Refoulement
- D. Déplacement

23- Ce Neurotransmetteur appelé "molécule du bonheur" est présent chez les patients atteints de la dépression, il s'agit de :

- A. Dopamine
- B. Sérotonine
- C. Bradikynine
- D. Noradrénaline

24- C'est une maladie mentale caractérisée par la perte du contact avec la réalité :

- A. Paranoïa
- B. Mégalomanie
- C. Schizophrénie
- D. Etat maniaque

25- La capacité du patient de comprendre ses propres motifs définit ce concept :

- A. Insight
- B. Insolation
- C. Inconscient
- D. Intrapyschique

26- La sismothérapie est un traitement qui se fait :

- A. Seulement dans la dépression
- B. Pour éviter la répétition des crises épileptiques
- C. Systématiquement à tous les malades mentaux
- D. Quand un patient résiste à une cure de chimiothérapie

27- C'est un syndrome qui concerne principalement des jeunes filles entre 12 et 20 ans et qui se traduit par une triade : amaigrissement, aménorrhée, anorexie.

- A. La schizophrénie
- B. L'anorexie mentale
- C. La névrose obsessionnelle
- D. La psychose maniaco-dépressive

28- Ayant un sens de supériorité exagéré, leurs relations avec les autres sont caractérisées par le besoin d'admiration et ils sont extrêmement sensibles aux critiques et aux échecs. On parle de :

- A. Personnalité borderline
- B. Personnalité hystérique
- C. Personnalité antisociale
- D. Personnalité narcissique

29- Parmi les critères suivants, lequel est spécifique de la définition d'une attaque de panique ?

- A. La peur de prendre la parole en public
- B. Peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou
- C. L'existence d'idées délirantes au moment du trouble
- D. L'accélération du rythme cardiaque et la dilatation des pupilles

30- En passant dans une rue à Port-au-Prince le 28 septembre dernier, on remarque un jeune garçon qui est entraîné de rire aux éclats, on lui pose des questions. Lui de répondre : j'aime beaucoup le feu et je me sens réellement bien en le regardant, j'ai déjà incendié 3 maisons et je suis prêt à continuer.

Ce garçon est un :

- A. Pyromane
- B. Kleptomane
- C. Voyeurisme
- D. Admirateur de feu

31- Le traitement de ce garçon face à ce comportement doit inclure, sauf :

- A. Un antidépresseur
- B. Un Beta bloquant
- C. La contention mécanique immédiatement
- D. Des Thérapies comportementales et cognitives

32- Lié au cerveau viscéral, il fonctionne selon le principe du plaisir et n'a donc aucune moralité. Il s'agit de :

- A. Le conscient
- B. L'inconscient
- C. Le préconscient
- D. Le subconscient

- 38- La maladie de Parkinson est caractérisée par :
- A. Une marche à pas rapides et des trémulations
 - B. Une Hypotonie musculaire et une marche à pas lents
 - C. Un tremblement en activité et une hypertonie généralisée
 - D. Une Hypertonie musculaire, un tremblement de repos, une marche à petit pas lent
- 39- Un de ces médicaments est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson, lequel ?
- A. Caféine
 - B. Pénicilline
 - C. Lévodopa
 - D. Acétaminophène
- 40- Dans quelle phase de la relation d'aide, la relation se noue-t-elle ?
- A. Résolution
 - B. Orientation
 - C. Exploitation
 - D. Identification
- 41- La psychose puerpérale est une pathologie fréquente chez :
- A. La femme
 - B. L'homme
 - C. Le nourrisson
 - D. L'adolescent
- 42- Brigitte explique à son amie Judith une stratégie pour contrôler ses émotions : « Pour me sentir bien, je m'habille comme *Rutshelle Guillaume*, je collectionne toutes ses œuvres et je l'imité en chantant et dansant ». Judith qui vient d'obtenir son diplôme en sciences infirmières, pense que Brigitte utilise le mécanisme suivant. Lequel selon vous ?
- A. la projection
 - B. La sublimation
 - C. L'identification
 - D. L'exhibitionnisme
- 43- Rodrigue est conduit par ses parents au service de psychiatrie pour son comportement inquiétant. Vous accompagnez en consultation le médecin qui le reçoit. Il vous signale à voix basse qu'il s'agit d'un cas d'hystérie. Quel est le mécanisme de défense mis en jeu dans un tel cas ?
- A. La projection
 - B. La conversion
 - C. La substitution
 - D. L'introspection