

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA SANTÉ
EXAMEN D'ÉTAT DES INFIRMIÈRES
SESSION ORDINAIRE

NOM..... PRENOM.....
 NIF/CIN..... INSTITUTION.....
 DATE: 17 DECEMBRE 2017

BLOC MEDICO CHIRURGICAL

1. Dina souffre de psoriasis .Elle vient à la clinique de son médecin en pleurs .Elle se plaint de la façon que les gens la regardent. Elle en souffre depuis un bon bout de temps. Elle a l'impression qu'elle est très laide avec toute les lésions .L'intervention la plus appropriée de l'infirmière est :
 - a) Informer le médecin de Dina des problèmes de la patiente
 - b) **Encourager la patiente à partager ce qu'elle ressent avec d'autres personnes avec le diagnostic de psoriasis, l'aider à trouver un groupe**
 - c) Lui suggérer des moyens de se couvrir les lésions
 - d) Déclarer que le médecin va lui prescrire un nouveau médicament

2. Une infirmière affectée au centre de sante de Moron reçoit un patient en clinique VCT. Dans l'objectif de recueillir le maximum d'information, quel types de question pourrait-elle poser au patient ?
 - a) Question directe
 - b) Question fermée
 - c) Question indirecte
 - d) **Question ouverte**

3. Une étudiante de 19ans, en classe terminale, déprimée, vous arrive dans un centre de sante pour une aménorrhée de 12 semaines. Elle présente des signes de présomption de grossesses et vous sollicite de l'aide. Qu'elle sera votre attitude ?
 - a) Lui dire de se faire avorter pour pouvoir continuer ses études
 - b) L'obliger à garder l'enfant à tout prix autrement ce serait un crime
 - c) **L'encourager à prendre la décision qui lui convient le mieux**
 - d) Lui dire de garder l'enfant et de le donner en adoption à la naissance

4. Une infirmière est attaquée au service de médecine interne de l'hôpital La paix et a comme patient Mr André qui reçoit du furosémide pour son hypertension artérielle. Pour un tel patient, un geste suivants est nécessaire dans sa prise en charge, lequel ?
 - a) Prendre sa fréquence cardiaque 4 fois par jour
 - b) Prendre sa fréquence respiratoire 2 fois par jour
 - c) **Prendre son poids chaque jour**
 - d) Prendre sa température chaque jour

5. Un patient à 49 ans a été hospitalisé à l'HUJ pour hépatite B. Deux mois après son exeat il voudrait participer à une campagne de don de sang à la croix rouge haïtienne comme donneur régulier. En tant qu'infirmière responsable de cette activité vous lui direz quoi ?
 - a) Il n y a pas de danger, il peut donner du sang
 - b) Il est trop faible pour donner du sang
 - c) **Il peut être porteur du germe, et ne doit pas donner du sang**
 - d) Il pose un acte de bon citoyen, et vous le félicitez

6. Monette fait une crise d'angor, vous l'installez en position assise avec les pieds pendants parce que :
 - a) C'est la position idéale pour lui donner des soins

- b) Le retour veineux est rapide dans cette position
 - c) **Le retour veineux est plus lent dans cette position**
 - d) La circulation artérielle se fait mieux

- 7. Si l'angine de la patiente ci-dessus n'est pas bien traitée, elle risque la complication suivante :
 - a) L'athérosclérose coronarienne
 - b) L'hypertension artérielle
 - c) **L'infarctus du myocarde**
 - d) L'œdème aigu des poumons

- 8. Mme Jean vient de monter les escaliers pour arriver au cabinet du médecin, combien de temps doit-elle atteindre avant que vous preniez sa pression artérielle ?
 - a) 5 minutes
 - b) 10 minutes
 - c) 15 minutes
 - d) **20 minutes**

- 9. Pour corriger l'anémie pernicieuse, quel médicament faut-il recommander à un patient ?
 - a) Le fer
 - b) L'acide folique
 - c) **La vitamine B12**
 - d) La vitamine C

- 10. Pour équilibrer son alimentation, quel enzyme faut-il recommander à un patient pour faciliter la digestion des protéines ?
 - a) amylase
 - b) cholinestérase
 - c) lipase
 - d) **pepsine**

- 11. Lors de l'alimentation entérale d'un patient que faut-il effectuer comme démarche préalable ?
 - a) Administrer directement le supplément d'aliment dans le tube
 - b) **Vérifier s'il y a des résidus dans l'estomac**
 - c) Donner à boire 10 cc d'eau au patient avant de le gaver
 - d) Demander au patient d'avaler sa salive

- 12. Immédiatement après l'administration de chaque gavage, que doit faire l'infirmière ?
 - a) Fermer le tube de Levin
 - b) **Instiller de l'eau dans le tube pour le rincer**
 - c) Installer le patient en position dorsale
 - d) Vérifier si le gavage est bien dans l'estomac

- 13. Jonas, 75 ans vient en consultation pour une douleur d'apparition brusque, irradiée à l'épaule gauche non calmée par la nitroglycérine. Il a une sensation de mort imminente, il vomit. Par ailleurs il fume depuis 30ans, environ 15 cigarettes par jour. Quelle est la pathologie à laquelle il faut penser en premier lieu ?
 - a) Angine de poitrine instable
 - b) **Infarctus du myocarde**
 - c) Angine de poitrine stable
 - d) Embolie pulmonaire

- 14. Le médecin prescrit de beta bloquant à Jonas, ses signes vitaux sont : TA 112/68 PLS 48 FR 24. Quelle sera la conduite de l'infirmière face à ce médicament ?
 - a) Elle donne ce médicament et avise le médecin
 - b) Elle donne ce médicament à l'inscrit au dossier
 - c) Elle ne donne pas ce médicament et laisse une note au dossier
 - d) **Elle ne donne pas ce médicament et avise le médecin**

15. Avant de donner congé à Jonas le docteur demande à l'infirmière de réaliser pour le patient une épreuve d'effort. Au cours de cette épreuve la tension chute à 90 /40 que fera l'infirmière ?
 - a) Elle ralentit la vitesse de l'effort et avise le médecin
 - b) Elle reprend la pression de Jonas et avise le médecin
 - c) **Elle arrête l'épreuve le met en position couchée et avise le médecin**
 - d) Elle continue l'épreuve et surveille l'évolution de Jonas
16. Avant l'hystérectomie le lavement évacuateur sera administré dans l'objectif suivant :
 - a) Favoriser la guérison de la place opératoire
 - b) Faciliter l'élimination des déchets biologiques
 - c) **Minimiser les risques de lésions accidentelles**
 - d) Réduire les risques d'infections intestinales
17. La position recommandée pour un patient en état de choc est :
 - a) **Position de Trendelenburg**
 - b) Position latérale de sécurité
 - c) Position dorsale
 - d) Position semi assise
18. Lors d'une injection par voie cutanée, l'infirmière constate que du sang remonte dans la seringue son premier geste sera :
 - a) Demander au patient de relâcher ses muscles
 - b) **Enlever l'aiguille**
 - c) Injecter lentement la solution
 - d) Retirer immédiatement le piston
19. En cas d'allergie lequel des éléments figurés du sang peut être altéré ?
 - a) Les basophiles
 - b) **Les éosinophiles**
 - c) Les lymphocytes
 - d) Les neutrophiles
20. Parmi les manifestations suivantes, identifier celles qui permettent d'évoquer une hyperthyroïdie ?
 - a) La bradycardie, l'amaigrissement, l'exophtalmie
 - b) La bradycardie, la prise de poids, l'exophtalmie
 - c) La tachycardie, la prise de poids, l'exophtalmie
 - d) **La tachycardie, l'amaigrissement, l'exophtalmie**
21. La glande thyroïde est responsable de la sécrétion de :

a) ACTH, ADH b) TSH, FSH	c) <u>T3, T4</u> d) TSH, LH
---	---
22. En cas de stéatorrhée, la diète recommandée est :

a) Hypo glucidique b) Hypo protidique	c) Hyper protidique d) <u>Hypo lipidique</u>
--	--
23. Parmi les manifestations suivantes, laquelle est la plus probante pour poser le diagnostic d'occlusion intestinale ?
 - a) **L'arrêt des selles et des gaz**

- b) La douleur abdominale
 - c) La nausée
 - d) Le vomissement
24. Les caractéristiques de vomissements qui permettent d'évoquer l'occlusion intestinale sont :
- a) **Alimentaire, bilieux, fécaloïde**
 - b) Bilieux, verdâtre, brun
 - c) Alimentaire et striée de sang
 - d) Bilieux, verdâtre, et striée de sang
25. L'occlusion est traitée chirurgicalement et l'un des rôles en post-op est :
- a) Obtenir le consentement du patient
 - b) Faire la préparation psychologique
 - c) **Surveiller la reprise du transit intestinal**
 - d) Expliquer au patient le but de l'intervention
26. Parmi les personnes suivantes, laquelle ne devrait pas prendre des anticoagulants :
- a) La personne qui est diabétique
 - b) **La personne qui a eu une extraction dentaire**
 - c) La personne hypertendue
 - d) La personne asthmatique
27. Pour administrer :
- a) 1 litre de Dw5% 1/2saline en 8heures, avec un perfuseur de 20gouttes /ml, a combien de gouttes faut-il mettre le soluté ?
- $8h \times 60mn = 480mn$
- R: $1l = 1000ml \times 20gttes = 20000mL$**
- $20000/480 = 41,6gouttes$ ou $42gttes/mn$
28. Dans les affections des voies respiratoires supérieures, on peut soulager le mal de gorge par :
- a) Les décongestionnants
 - b) Du jus de citron
 - c) **Des gargarismes à l'eau tiède salée**
 - d) De la tétracycline
29. Le syndrome de malabsorption des graisses peut conduire le patient à une carence en vitamine :
- a) A, B12, E, K
 - b) C, B12, E, K
 - c) A, B6, D, K
 - d) **A, D, E, K**
30. Un patient avec hémorragie digestive reçoit une transfusion de sang total, en tant qu'infirmière superviseuse d'un service d'urgence vous recommandez a votre assistante de surveiller. La plus dangereuse des complications transfusionnelles :
- a) Réaction allergique
 - b) Réaction fébrile
 - c) Surcharge vasculaire
 - d) **Réaction hémolytique**
31. Mario s'est brulé le bras gauche, selon la règle des 9 de wallace, quel pourcentage correspond cette partie du corps :
- a) **9%**
 - b) 18%
 - c) 36%
 - d) 27%

32. Mario est conduit suite à un accident de motocyclette à l'hôpital des Cayes il est inconscient il a une bosse au front et ces signes vitaux sont : TA 100/60, FR24, PLS64, T36, 7°C. Quelle est la démarche prioritaire de l'infirmière ?
- L'évaluation de son niveau de réaction**
 - L'état nutritionnel
 - Les soins de confort pour Mario
 - Lui maintenir une veine ouverte
33. L'herpès génital est diagnostiqué chez Jean Paul par son médecin traitant. Associer cette pathologie aux symptômes correspondants :
- Bubon inguinal, douleur au bas ventre, céphalée
 - Difficulté à uriner, anorexie bouton indolore sur le gland
 - Douleur à l'aîne, vésicules sur le gland brûlure mictionnelle**
 - Perte de substance au gland écoulement urétral fièvre

CHOISIR L'EXCEPTION

34. Les buts de la colostomie sont : exceptés
- Corriger un blocage au niveau de l'intestin
 - Procurer du repos à la muqueuse intestinale**
 - Rétablir l'élimination intestinale à la suite d'une suite d'une occlusion
 - Pour décompresser et drainer le tube digestif en occlusion
35. Les organes situés sous le diaphragme sont exceptés :
- Œsophage**
 - Pancréas
 - Vésicule biliaire
 - Foie
36. Les endroits les plus utilisés pour injections IM sont les suivants, exceptés :
- Muscles deltoïde
 - Muscles latéraux des cuisses
 - Muscles latéraux des jambes**
 - Muscles fessiers
37. Le diabète est responsable des complications ophtalmologiques suivantes à l'exception de :
- Le glaucome
 - Les chalazions
 - L'exophtalmie**
 - Les paralysies oculomotrices
38. La physiologie du système endocrinien est caractérisée par les étapes suivantes, excepté ?
- La croissance
 - Le métabolisme
 - La mort cellulaire**
 - La maturation
39. Les pathologies suivantes peuvent apparaître suite à une transfusion sanguine à l'exception de :
- Sida
 - Hépatite
 - Tuberculose**
 - Syphilis
40. L'infirmière doit faire un lavage de l'œil, elle prépare le matériel suivant à l'exception de :
- Un haricot
 - Des gants
 - Des compresses
 - Des flacons de D/W à 5%**

Entourez la bonne réponse

41. En évaluant l'état respiratoire d'un patient souffrant d'une fracture des côtes, l'infirmière notera :
- a) une douleur avec les Justifications
rapide
 - b) une respiration profonde et lente
 - c) une respiration profonde et
 - d) une respiration essoufflante
42. Mme Mimose âgée de 85 ans, souffre de reflux gastroœsophagien elle doit éviter les aliments suivantes :
- a) Aliments riches en protéines
 - b) Poissons et sardines
 - c) Lait écrémés
 - d) Café, thé, et chocolat
43. Un patient est admis avec un poignard implanté dans son abdomen, durant l'évaluation initiale du patient il serait important pour l'infirmière de :
- a) D'évaluer le patient pour choc
 - b) D'enlever le poignard pour mieux évaluer le site
 - c) D'évaluer le péristaltisme
44. Quel serait le soin de nursing approprié pour empêcher le développement d'escarres chez Mr. Paul âgé de 82 ans qui est un paraplégique.
- a) Enregistrer les ingesta et les excréta toutes les 2 heures.
 - b) Changer le patient de position toutes les 2 heures.
 - c) Administrer le médicament contre la douleur toutes les 2 heures
 - d) Contrôler les signes vitaux toutes les 2 heures.
45. Gilbert vient de subir une intervention chirurgicale et en post-op l'infirmière qui suit le patient constate que les signes vitaux sont altérés. La cause la plus fréquente d'obstruction des voies aériennes en post-Op est :
- a) La présence de la canule au niveau de la bouche en post-Op
 - b) L'affaiblissement et le relâchement de la langue et de la mâchoire
 - c) La présence d'aliment au niveau de l'estomac lors de l'intervention
 - d) L'absence de tube de Levine branché sous appareil GOMCO en post-Op.
46. Jonathan est traité pour hypoglycémie mais son état clinique se détériore. Il paraît désorienté, s'exprime avec difficulté, est apathique et son niveau de glycémie continue à diminuer. Laquelle des actions suivantes l'infirmière devrait-elle appliquer ?
- a) Lui offrir une collation avec des protéines et de l'amidon
 - b) Commencer une perfusion de dextrose à 5%
 - c) Lui administrer 1 mg de Chlorhydrate de glucagon par voie IM
 - d) Surveiller sa diurèse
47. L'état de Jonathan se stabilise et avant le départ, le médecin prescrit du chlorhydrate de metformine 500mg PO toutes les six heures. Quelle quantité de médicament le patient devrait-il prendre sur une période de 24 heures.
- a) 1 gm
 - b) 1 gm5
 - c) 2 gm
 - d) 3 gm
48. Marjorie est de Groupe Sanguin A rhesus négatif, de quel groupe sanguin peut-elle recevoir du sang ?
- a) A rhesus positif

- b) AB rhésus positif
- c) AB rhésus négatif
- d) **O rhésus négatif**

49. La carence de cet élément diminue la production des hématies :

- a) Vitamine C
- b) Fer
- c) Vitamine D
- d) **Folates**

50. C'est l'ensemble des devoirs et des obligations imposés aux membres d'un ordre ou d'une association professionnelle.

- a) Ethique
- b) Morale
- c) **Déontologie**
- d) Bioéthique

BLOC MATERNO INFANTILE

CHOISIR LA BONNE REPONSE

1. Parmi les signes suivants, lesquels peuvent faire évoquer l'éclampsie ?

- a) Augmentation de la tension artérielle-douleur abdominale
- b) Douleur abdominale-polyurie
- c) Troubles de la vision-polyurie
- d) **Troubles de la vision-augmentation de la tension artérielle**

2. La respiration, la diurèse et les réflexes ostéo-tendineux sont les éléments à surveiller avec l'administration de :

- a) Ampicilline
- b) Ocytocine
- c) Hydralazine
- d) **Sulfate de magnésium**

3. On administre de l'acide folique à une femme enceinte au premier trimestre de la grossesse pour prévenir :

- a) Une anémie chez le fœtus
- b) Une anémie chez la femme enceinte
- c) Un déficit nutritionnel chez la femme enceinte
- d) **Des malformations neurologiques chez le fœtus**

4. L'abruptio placentae est une urgence qui nécessite

- a) De préparer la patiente pour installer un cathéter
- b) De préparer la patiente pour une échographie
- c) D'obtenir un bilan rénal le plus vite que possible
- d) **De placer une voie IV avec du dextran en attendant le médecin**

5. L'hormone qui déclenche la montée laiteuse est :

- a) **Prolactine**
- b) Ocytocine
- c) Adrénaline
- d) Progestérone

6. L'hormone qui favorise l'évacuation du lait est :

- a) Prolactine
- b) Adrénaline
- c) Progestérone
- d) **Ocytocine**

Annales-gésique ! Édition 2018

7. L'absence de cette bactérie protectrice des voies génitales féminines, favorise les infections opportunistes en particulier les mycoses :
 - a) Bacille de Ducrey
 - b) **Bacille de Doderlein**
 - c) Bacille de Koch
 - d) Bacille d'Eberth
8. Le col de l'utérus doit rester hermétiquement fermé durant tout la période gestationnelle. Son ouverture durant cette période correspond à :
 - a) Cervicite
 - b) Immaturité du col
 - c) **Béance de col**
 - d) Prolapsus du col
9. La fréquence cardiaque fœtale est dite normale si elle est rangée entre :
 - a) 100 à 140 bpm
 - b) 120 à 160 bpm
 - c) **110 à 150 bpm**
 - d) 130 à 170 bpm
10. Certains médicaments et pilules ne font pas bon ménage, l'action contraceptive des œstrogènes peut être inhibée par :
 - a) Anticonvulsivants, antiseptiques, neuroleptique
 - b) Phénobarbital, Enalapril, Métronidazole
 - c) **Rifampicine, Griséofulvine, Phénobarbital**
 - d) Rifampicine, Antiseptiques, Enalapril
11. Le score de Silverman
 - a) Est un duplicata du score d'Apgar
 - b) **Evalue la détresse respiratoire du nouveau-né**
 - c) Permet de mesurer le surfactant
 - d) Permet d'apprécier la maturité cérébrale
12. Quelles manifestations indiquent à l'infirmière qu'une parturiente se trouve dans la phase active de la première étape du travail ?
 - a) **Dilatatoire cervicale de 3 à 4 cm, avec contractions utérines modérées toutes les 3 à 4 min**
 - b) Dilatation cervicale de 5 à 6 cm avec contractions utérines durant 45 à 60 secondes
 - c) Écoulement sanguin modéré ou important accompagne d'un besoin de pousser à chaque contraction utérine
 - d) Léger écoulement muqueux avec contradiction utérines irrégulières durant 10 à 30 secondes
13. Quelles sont les caractéristiques de l'éruption cutanée qui permettent à l'infirmière de soupçonner une rougeole chez un enfant :
 - a) Maculo-papules, vésicules et croutes apparaissant par groupes et progressant ensemble
 - b) Maculo-papules évoluant rapidement en vésicules et en croutes, présentes au même moment sur toute la surface du corps
 - c) **Maculo-papules irrégulières de couleur rouge brique débutant à la tête et au cou en s'étendant progressivement vers le bas du corps.**
 - d) Maculo-papules sous forme de petits points de couleur rosée, débutant au tronc et s'irradiant aux membres supérieures, disparaissant à la pression.
14. Quelles manifestations de la rougeole, autre que l'éruption cutanée, l'infirmière peut elle observer chez un enfant ?
 - a) **Catharre oculo-nasal, photophobie, fièvre, toux rauque.**
 - b) Fièvre, mal de gorge, anorexie œdème de la glande parotide
 - c) Gingivite, fatigue, conjonctivite, ulcère buccal
 - d) Larmoiement, toux, nausées, céphalée

15. Magda est conduite à la maternité Isaïe Jeanty pour des contractions utérines à 38 semaines de gestation, l'infirmière qui l'évalue repère lors du toucher vaginale le menton, de quelle présentation s'agit-il ?

a) Présentation du sommet
b) Présentation du siège
c) Présentation de la face
d) Présentation de l'épaule

16. Mettez les lettres dans les cases appropriées :

a) Résulte de l'union des cellules sexuelles mâles et femelles
b) Fixation de l'œuf fécondé en un point de la muqueuse utérine
c) Définit le nombre de grossesse sans s'occuper que la grossesse ait été conduite à terme
d) Designe le nombre d'accouchement que le bébé soit mort ou vivant

1- Parité ☐ 2- Gravidité ☐ 3- Nidation ☐ 4- Fécondation ☐

REPONSES : a = 4 b = 3 c = 2 d = 1

17. Le critère le plus objectif de la croissance et le meilleur guide de l'état nutritionnel de l'enfant est :

a) La taille/poids
b) Le périmètre crânien
c) Le poids/ âge
d) Le périmètre brachial

18. Parmi les fonctions sensorielles, c'est la plus développée à la naissance et la plus universelle

a) Le goût
b) L'odorat
c) Le toucher
d) La vue

19. Sabine âgée de 22 ans vient en consultation dans votre service pour saignement, elle dit avoir présenté ses menstrues le premier Décembre pour une durée de 4 jours et depuis le 13 Décembre elle saigne à nouveau, il s'agit d'un cas de :

a) Dysménorrhée
b) Métrorragie
c) Ménorragie
d) Oligomenorrhée

20. Les Œstrogènes chez la femme font partis des hormones :

a) Que les follicules ovariens secrètent durant le cycle menstruel
b) Que les follicules ovariens secrètent pendant la grossesse
c) Qui intervienne sur le développement de la morphologie féminine et de pilosité pubienne
d) Qui participent à l'ouverture du col et favorisent la montée des spermatozoïdes

21. La rétention de sang dans la cavité vaginale, empêchant l'écoulement des règles à la puberté s'appelle

a) Hématome
b) Hématocolpos
c) Hémosalpinx
d) Mucocolpos

22. Maryse souffre en général de forte dysménorrhée, quel conseil lui prodigueriez-vous ?

a) Avoir des relations sexuelles avant la menstruation
b) Changer les dispositifs d'hygiène le plus souvent que possible
c) Eviter la sédentarité, consommer moins de sucre dans le prémenstruel
d) Utiliser les serviettes Hygiénique au lieu de tampons

23. Le meilleur conseil à donner à un groupe de femmes adultes pour prévenir le cancer du col est :

a) Eviter d'avoir des relations sexuelles précoces
b) Réduire les rapports sexuels hebdomadaires
c) Réaliser un test manuel de dépistage précoce

Annales-gésique ! Édition 2018

- b) La nécessité de presser mamelons
- c) **La nécessité de nourrir le bébé au lait de mère à la demande**
- d) La notion que le bébé doit être placé en décubitus ventral durant son sommeil

42. La mesure du temps de recoloration cutanée s'obtient en réalisant une pression sur la peau et en mesurant le temps de recoloration qui est considéré comme normal si :

- a) Supérieur à 3 secondes
- b) **Inferieur ou égale à 2 secondes**
- c) Inferieur ou égale à 5 secondes
- d) Inferieur à 10 secondes

43. Installez 120mg théophylline pour un enfant de 3 ans pesant 29lbs dans 500cc d soluté à administrer sur 6 heures de temps à l'aide d'une microgoutte ?

R. **Calcul : 500 cc divisé par 6heures=83 gouttes**
83 gouttes divisées par 3=27 microgouttes

44. Le médecin vous demande d'administrer 45mg de furosémide IV à un enfant admis pour la glomérulonéphrite aigue. Vous disposez d'ampoules de 20mg pour 2ml.
 Combien de ml devez- vous préparer ?

R. **2ml volume disponible**

20mg dose disponible

45mg dose prescrite => $(45/20) \times 2\text{ml} = 4,5\text{ml}$

x ml

45. Le score d'APGAR permet d'évaluer l'état du nouveau-né

- a) Il évaluer la respiration et la diurèse
- b) Il mesure la tonicité et la température du nouveau-né
- c) Il est mesuré 2 fois, à une minute et à cinq minutes d'intervalle
- d) **Il est mesuré à une, trois et cinq minutes et dix minutes d'intervalle**

46. Parmi ces paramètres lequel fait partie du score d'APGAR

- a) le sexe de l'enfant
- b) **Le tonus**

- c) l'âge gestationnel
- d) Le grasping

47. Après la pesée d'un nourrisson au centre nutritionnel, l'infirmière note que la mère ne donne pas de protéines à l'enfant. Elle n'est pas en mesure de trouver des protéines animales dans sa localité. La meilleure proposition pour suppléer à ce déficit est :

- a) Conseillez des bouillies de farine au sirop de canne
- b) Proposer du jus de figue et de betterave
- c) **Suggérer des portions de maïs et de légumes verts**
- d) Recommander du manioc

48. Martine enceinte de deux mois, est reçue à la salle d'urgence de votre hôpital pour fortes douleurs hypogastriques, saignement en quantité minime et syncope. Son évaluation met en évidence les signes vitaux suivant : un pouls à 120b/m, TA 70/50mm Hg, Les conjonctives palpébrales sont pales. En présence de cette situation clinique votre raisonnement vous oriente vers :

- a) Môle hydatiforme
- b) Menace d'avortement

- c) Avortement incomplet

- d) **Grossesse ectopique rompue**

49. Un nouveau-né dont la température est de 35,5 C est en :

- a) Hyperthermie
- b) Normothermie

- c) Hypothermie
- d) Hyperglycémie

50. Georgette vient de mettre au monde son deuxième enfant, elle décide de ne pas allaiter car lors de la naissance de l'ainé, elle avait une galactorrhée ; en outre elle doit reprendre le travail dans 45 jours et sera le plus souvent en province. Quelle méthode de contraception lui recommanderiez-vous ?

- a) La pilule du lendemain
- b) Un progestatif injectable
- c) Le préservatif
- d) Le norplant

BLOC SANTE COMMUNAUTAIRE

ENTOURER LA BONNE REPONSE :

1. Avant d'administrer le SAT, l'infirmière doit réaliser un pré test en administrant le produit par :

- a) Injection sous-cutanée
- b) Injection intramusculaire
- c) Injection intradermique
- d) Injection intraveineuse

2. Le BCG s'administre

- a) A partir de 4 semaines de vie par voie Intradermique à raison de 0,05 ml
- b) A partir de 6 semaines de vie par voie intradermique à raison de 1ml
- c) Dès la naissance, par voie intradermique à raison de 0,01 ml
- d) Dès la naissance par voie intradermique à raison de 0,05ml ou 0,1ml

3. Marcus âgé de 15 ans arrive à votre institution avec une morsure par animal domestique (chien), le premier geste de l'infirmière sera :

- a) Administrer du sérum antitétanique
- b) Administrer le vaccin antirabique
- c) Laver la plaie avec de l'eau et du savon
- d) Effectuer un pansement humide

4. Tous les vaccins du PEV doivent être conservés à une température de :

- a) 2 à 6°C
- b) 4 à 10°C
- c) 2 à 8°C
- d) 0 à 10°C

5. Rachel âgée de 3 ans est admise à l'unité de soins intensifs pour malnutrition aiguë sévère. Elle est placée sous un traitement diététique approprié. 72 heures après son admission, lequel des signes suivants témoigne d'une évolution satisfaisante ?

- a) Une perte de poids lié à la fonte des œdèmes
- b) Une stagnation pondérale
- c) Une courbe de poids ascendante et fonte des œdèmes
- d) Une augmentation du poids avec œdème résiduel

6. La malaria est :

- a) Une maladie virale transmissible
- b) Une maladie bactérienne transmissible
- c) Une maladie sexuellement transmissible
- d) Une maladie parasitaire transmissible

7. Parmi les mesures préventives contre SIDA, on peut énumérer ceux qui suivent, excepté

- a) Utiliser un préservatif
- b) Utiliser des seringues à usage Unique
- c) Limiter le nombre de partenaire
- d) Utiliser le diaphragme

8. L'approche collective et administrative de problème de santé d'une population sous ses aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels est :

- a) La santé communautaire
- c) La santé publique

- b) La collectivité
- d) la communauté
9. Mettez la lettre correspondant au chiffre :
- Pénétration d'un agent pathogène et sa multiplication dans l'organisme =2
 - Présence de parasites sur la surface corporelle et les intestins=5
 - Nombre de nouveaux cas dans une population donnée pendant la période d'observation=1
 - Une infection généralisée dans un pays=3
- Incidence c
 - Infection a
 - Epidémie d
 - Endémie
 - Infestation b
10. Parmi les indicateurs qui suivent lesquels permettent d'évaluer l'état de santé d'une population ?
- la létalité et la mortalité
 - la létalité et la morbidité
 - la morbidité et la mortalité**
 - la natalité et la morbidité
11. Laquelle des propositions suivantes correspond à l'étude complète d'une population ?
- enquête
 - étude
 - Recensement**
 - sondage
12. Michel placé sous traitement anti-TB depuis 5 mois et plus, de traitement présente des crachats positifs, Laquelle des conclusions qui suivent, correspond à sa situation :
- Abandon
 - Echec**
 - Rechute
 - Résistance
13. Lors d'une séance d'éducation dans un centre de santé, Martine se propose d'aborder des points-clés sur la promotion de la croissance et le développement de l'enfant. Laquelle des assertions qui suivent, peut faire partie de ses objectifs :
- Allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois**
 - Allaitement maternel exclusif jusqu'à 1 an
 - Allaitement mixte+ ajouts de céréales à 1 an
 - Allaitement maternel+ bouillie lactée à partir de 2 mois
14. Marvens, professeur à l'université fait un exposé sur le VIH. Dans les points à retenir il fait ressortir que dans un centre de dépistage volontaire, le premier test à réaliser est :
- Capilus
 - Elisa
 - détermine**
 - Unigold
15. Triez ces déchets et mettez-les dans des poubelles convenables (les chiffres devant les lettres)
- Déchets à risque infectieux (2)
 - Déchets radioactifs (3)
 - Déchets piquants ou coupants (4)
 - Déchets domestiques (1)
- poubelles de code noir
 - poubelles de code jaune
 - poubelles de code rouge
 - boite de sécurité
16. parmi les vitamines suivantes, laquelle est contre- indiquée chez une femme enceinte de 5 mois :
- Acide folique
 - Vitamine C
 - Vitamine A**
 - Vitamine du groupe B

Annales-gésique ! Édition 2018

17. La place qu'une personne occupe dans la structure sociale se définit comme :
 a) agrégat social b) statut matrimonial c) stratification sociale d) Rang social
18. le tréponema pallidum est l'agent causal de :
 a) Zona b) condylomes acumines c) syphilis d) chancre de Ducrey
19. Parmi ces virus lequel est responsable du cancer du col est ?
 a) HPV6 et HPV11 b) HPV16 et HPV18 c) HSV-2 d) HSV-1
20. L'étape obligatoire à respecter avant de fournir les services de PF ou VIH/SIDA
 a) Le counseling c) L'examen au speculum
 b) Le dépistage rapide d) La divulgation du partenaire
21. Le mantoux test est la méthode standard pour le diagnostic de l'infection par :
 a) Mycobacterium avium c) Mycobacterium leprae
 b) Mycobacterium bovis d) Mycobacterium tuberculosis
22. L'infirmière du centre de santé de corail explique les critères d'éligibilité d'une femme à pratiquer la MAMA comme méthode de PF
 a) La femme n'a pas présenté de règles depuis son accouchement
 b) L'enfant doit être nourri au sein exclusivement
 c) L'enfant doit être nourri au biberon
 d) La femme doit nourri au sein et au biberon
23. Afin de stimuler la population sur la prévention du choléra, endémique dans la communauté, l'infirmière du centre de santé insiste sur la mesure éducative la plus simple pour éviter cette maladie laquelle ?
 a) Boire de l'eau limpide
 b) Consommer une nourriture froide
 c) Laver systématiquement les mains
 d) Manger les fruits dès la cueillette
24. Valérie âgée de 7 ans a été emmenée au centre de santé par sa mère pour fièvre, perte d'appétit, dysphagie. Lors de la consultation, le médecin observe la présence de pseudo-membrane dans l'arrière gorges. De quelle maladie s'agit-il ?
 a) Coqueluche b) Diphtérie c) rougeole d) Tétanos
25. La mesure de l'indice de Masse corporelle (IMC) traduit un risque nutritionnel pour la femme enceinte et le fœtus si :
 a) IMC=18,80 c) IMC=24
 b) IMC<18 d) IMC= compris entre 18.5 et 24
26. Magda est mariée depuis trois ans à Justin, divorcé et père d'un garçon. En dépit des rapports sexuels réguliers sans contraception, les essais pour aboutir à une grossesse sont restés jusqu'ici infructueux. Le diagnostic médical le plus probable serait :
 a) Infertilité primaire c) Stérilité primaire
 b) Infertilité secondaire d) Stérilité secondaire
27. Marcel va avoir une intervention chirurgicale, l'infirmière le voit allumer une bougie, faire une prière et s'enduire d'une lotion. A sa place, vous interviendrez de la manière suivante :
 a) Vous n'avez pas le droit de le faire

- b) Vous savez que le seigneur peut vous aider
 c) **Vous laissez faire le patient**
 d) Vous l'aidez à s'enduire de lotion
28. Marie arrive à l'hôpital HUEH avec les symptômes suivants : fièvre, éruption cutanée, conjonctivite, des douleurs musculaires et articulaires, céphalée. Identifier la pathologie liée aux symptômes présentés par Marie
 a) Malaria
 b) Typhoïde
 c) Chikungunya
 d) **Zika**
29. Le malade a droit à la confidentialité, cela suppose que l'infirmière doit :
 a) Être à l'heure tous les jours à son travail
 b) Faire preuve de compétence
 c) **Respecter le secret professionnel**
 d) Respecter les règlements de l'institution de Santé
30. Calculer le pourcentage des cas selon l'âge.
 Les données suivantes ont été recueillies durant une enquête dans une localité se ST Marc :
 population totale=10320 Enfants âgés de 5ans=3350
 Naissance vivantes=850 Décès chez les moins de 5ans=161
 Décès par diarrhée chez les moins de 5ans=36 Décès par infection chez les moins de 5ans= 32
 Calculer : a) le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5ans pour 1000
 b) le taux de mortalité par infection chez les moins de 5ans pour 1000
Réponse a) $=161 \times 1000 / 3350 = 48.05 / 1000$ **Réponse b) $32 \times 1000 / 850 = 37.64 / 1000$**
- CHOISIR L'EXCEPTION**
31. La malnutrition protéino-énergétique (MPE) chez les enfants de 1 à 5 ans a sa base dans, sauf :
 a) Les diarrhées récurrentes
 b) **L'allaitement maternel jusqu'à 2ans**
 c) La diversification alimentaire précoce
 d) Les épisodes d'infections respiratoires chroniques
32. L'infirmière en santé communautaire doit être formée dans les domaines suivants exceptés :
 a) Sociologie
 b) Démographie
 c) Statistique
 d) **Jurisprudence**
33. Font partie des domaines d'intervention de la santé communautaire, excepté :
 a) Promotion de la santé
 b) Protection de la santé
 c) **Restauration de la santé**
 d) Economie de la santé
34. La prise en charge efficace des IST sous-tendent 4 piliers, sauf :
 a) Le counseling et l'éducation
 b) La promotion de l'adhérence aux traitements
 c) **La prématurité des rapports sexuels**
 d) Le traitement des conjoints
35. Une bonne gestion financière de centre de santé permet tout ceci, sauf :
 a) **De diminuer les activités liées aux soins**
 b) D'améliorer la qualité des soins
 c) De planifier le travail à réaliser

d) De prévoir les dépenses à effectuer

36. Une surveillance clinique lors de la clinique prénatale a les buts suivants, excepté :

- a) Dépister précocement les anomalies fœtales
- b) Dépister précocement les pathologies maternelles
- c) Prévenir les pathologies maternelles antérieures à la grossesse
- d) **Veiller au bon déroulement de l'accouchement**

ENTOUREZ La BONNE REPONSE

37. Les relations existant entre les autorités hiérarchiques et les cadres techniques en fonctions de leurs postes de travail s'élaborent du point de vue graphique à travers :

- a) Une description de tâches
- b) **Un organigramme**
- c) Une liaison entre les postes de travail
- d) Une organisation structurée

38. Dans la politique nationale de sante élaborée par le MSPP, le paquet essentiel de service permet de :

- a) Assurer la gestion d'un programme de sante
- b) Offrir une gamme de service à la population uniquement en zone rurale
- c) **Fournir une meilleure prise en charge à la population générale**
- d) Réaliser un meilleur choix de médicaments essentiels particulièrement en zone urbaine

39. Robens âgé de 11 mois est venu au centre de sante de Bizoton, accompagné de sa mère. Dans son carnet de vaccination, vous constatez qu'il a reçu :

- BCG et Polio 0 à la naissance + 3 doses de Polio
 - Pentavalent 3 doses et un capsule de vitamine A
- Quel vaccin peut-il recevoir aujourd'hui ?

- a) DTP/ Polio rappel
- b) Pentavalent- Polio rappel
- c) **Rougeole-rubéole**
- d) DTP-Polio-Hib-Hep B

40. Pour mesurer les déterminants de la santé on utilise des indicateurs directs et indirects, parmi ces derniers lequel est un indicateur indirect :

- a) Esperance de vie
- b) **Conditions de vie**
- c) Taux de mortalité infantile
- d) Taux de fécondité

41. Lors de la fécondation l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent :

- a) **Au tiers externe de la trompe**
- b) Au tiers interne de la trompe
- c) Dans la cavité péritonéale
- d) Dans la cavité utérine

42. Lorsque vous obtenez des résultats positifs après un examen de laboratoire on parle de cas :

- a) Certains
- b) **Probables**
- c) **confirmés**
- d) Possibles

43. Parmi les propositions qui suivent laquelle est dû à la déficience en iode :

- a) **Le crétinisme**
- b) L'idiotisme
- c) Le mongolisme
- d) Le rachitisme

44. Les contraceptifs injectables constituent une bonne méthode de planning familial pour les raisons qui suivent :

- a) **C'est une méthode à la fois de longue durée et réversible**
- b) La femme doit se souvenir de prendre la dose chaque jour, à la même heure
- c) l'injection ne convient pas aux femmes des milieux ruraux

Annales-gésique ! Édition 2018

- d) Toutes les réponses sont vraies
45. Parmi les assertions suivantes, laquelle concerne le norplant ? :
- Peut entraîner la stérilité
 - C'est une méthode réversible avec retrait**
 - Convient aux femmes qui ont de nombreux partenaires sexuels
 - Peut être administré à n'importe quel moment du cycle menstruel
46. Laquelle de ces carences peut contribuer à une diminution de la vision nocturne jusqu'à la cécité :
- Une carence en fer
 - Une carence en folates
 - Une carence en vitamine A**
 - Une carence en zinc
47. Dans le calendrier national de vaccination, la première dose de vaccin contre la rougeole se donne à :
- 7 mois
 - 12 mois
 - 9 mois**
 - 15 mois
48. Parmi les infections opportunistes les plus courantes en Haïti on peut considérer la série suivante :
- Tuberculose, candidose buccal, zona**
 - Candidose buccal, zona, Herpès génital
 - Zona, Herpès génital, Tuberculose
 - HPV, Hépatite, Herpès génital
49. Tous les établissements suivants sont des lieux de prestation de soins sauf :
- SONUBE
 - Hôpital Universitaire
 - Hôpital communautaire de référence
 - Poste de rassemblement**
50. Vous êtes responsables de la clinique nutritionnelle d'un centre de santé bien équipé, Mirna vous amène sa fille âgée de 3 ans. Ses membres inférieurs prennent le godet, les cheveux sont roux, l'abdomen est distendu. A l'interrogatoire, la mère vous explique que l'enfant est grincheux, n'a pas d'appétit. Son histoire alimentaire révèle que l'enfant boit de la soupe de biscuits le matin, mange du riz ou du maïs à midi ; elle n'aime pas le poids en sauce et le soir consomme de la bouillie de manioc non lactée. Face à cette situation quelle est votre démarche ?
- Prescrire du lait et conseiller des aliments riches en fibres, en graisses et en protéines
 - Fournir des multivitamines et recommander une diète équilibrée
 - Administrer de la vitamine A et expliquer la préparation du lait enrichi**
 - Donner un antianémique et solliciter des examens de labo.

BLOC SANTÉ MENTALE

Choisir la bonne réponse

- Ces médicaments psychotropes sont utilisés pour traiter les troubles de l'humeur :
 - Les anticholinergiques
 - Les antidépresseurs**
 - Les neuroleptiques
 - Les neurotropes
- Dans le cadre de la prise en charge des patients avec trouble bipolaire, une surveillance stricte de la concentration sanguine des médicaments régulateurs doit se faire :

- a. Tous les 2 mois au cours du 1^{er} trimestre
 - b. Tous les 15 jours au cours des 2 premiers mois
 - c. **Chaque 3 mois durant le 1^{er} semestre**
 - d. Chaque mois au cours des 2 1^{er} mois
- 3- Parmi les signes de surdosage au Lithium on peut évoquer :
- a. Constipation
 - b. Protrusion de la langue
 - c. Logorrhée
 - d. **Raideur de la mâchoire entraînant des difficultés pour parler**
- 4- La meilleure observance du traitement avec le lithium nécessite un régime
- a. **Hypoglucidique**
 - b. Hypolipidique
 - c. Hyposodé
 - d. Hypersodé
- 5- En présence d'un surdosage au lithium dans le traitement de la bipolarité, quel autre médicament peut-on administrer ?
- a. Acide Valproïque
 - b. Imipramine
 - c. Phénytoïne
 - d. **Tegretol (carbamazépine)**
- 6- Mr. Blaise, 50 ans hétérophrène, reçoit un traitement neuroleptique depuis l'âge de 20ans. Un matin l'infirmière va lui administrer son traitement et remarque qu'il est un peu irritable, sa poitrine est déformée et il fait des mouvements répétitifs involontaires avec sa bouche. L'infirmière pense à un effet indésirable du traitement en l'occurrence :
- a. Une crise convulsive
 - b. Un comportement menaçant
 - c. **Une dyskinésie tardive**
 - d. Un évanouissement
- 7- Quel doit être la conduite de l'infirmière dans ce cas ?
- a. Lui administrer le traitement comme prévu
 - b. Lui demander d'aller se baigner car cela peut l'aider
 - c. Ne rien faire cela va passer automatiquement
 - d. **Ne pas lui administrer le traitement et aviser le médecin**
- 8- Michael est un toxicomane connu et son niveau de dépense est telle que le médecin envisage un traitement substitutif pour le désintoxiquer, le choix devrait se porter vers :
- a. Cyproheptadine
 - b. **Chlorhydrate de méthadone**
 - c. Valium
 - d. Rivotril

L'automatisme mental se définit comme une activité motrice involontaire, accompagnée de délires ou de confusions où le patient ne se souvient de rien. Il peut se rencontrer dans l'un des cas suivants lequel ?

- a. L'anorexie mentale
- b. L'hystérie
- c. Le blocage mental
- d. **La schizophrénie**

0- Lise souffre de la schizophrénie paranoïde. Elle reçoit tous les mois une injection de modécate decanoate. L'infirmière pense qu'elle présente des effets secondaires à ce traitement. Lequel des signes suivants confirme l'impression ?

- a. Ataxie
- b. Polyurie
- c. Dépendance
- d. **Changement du cycle menstruel**

1- Parmi ces antécédents, lequel peut être un facteur favorisant de maladie mentale :

- a. Une carence affective
- b. Un enfant abandonné par ses parents
- c. **Un enfant de mère schizophrénique**
- d. Mauvaise relation avec ses parents

2- Les capacités intellectuelles atteignent leur maximum dans :

- a. **La vingtaine**
- b. La trentaine
- c. La quarantaine
- d. La cinquantaine

13- Mme Jacques reçoit dans sa thérapeutique le largatil comprimé de 100mg BID. Parmi les effets cliniques suivants lequel est imputable à ce médicament :

- a. **Calme l'anxiété**
- b. Entraîne une agitation
- c. Provoque une perte de poids
- d. Cause un enchièvrement nasal

14- Gabriel est amené au commissariat de Delmas pour agressivité dans les rues de la capitale, agitation psychomotrice. En l'absence du médecin, quel doit être le 1^{er} geste à faire par l'infirmière ?

- a. **Administrer un cocktail au patient**
- b. Donner à manger au patient
- c. Donner des soins d'hygiène au patient
- d. Mettre le patient en chambre fermée

15- Joséphine devait participer à une excursion qui a été reportée à une date ultérieure à cause du cyclone. Dans la soirée précédant le jour, Sarah répète à tout le monde ; « demain je vais à l'excursion ». le mécanisme de défense utilisé par Sarah s'appelle :

- a. **Intellectualisation**
 - b. Rationalisation
 - c. Sublimation
 - d. Projection
- 16- Raphaël bénéficie d'une évaluation psychologique en raison de ses performances scolaires non satisfaisantes selon ses professeurs. Le test du quotient intellectuel le situe entre 20 et 25. Il est donc classé dans la catégorie :
- a. Débile léger
 - b. Débile moyen
 - c. **Débile profond**
 - d. Débile grave
- 17- Laquelle des propositions qui suivent n'est pas utilisée en communication :
- a. Confrontation
 - b. **Sublimation**
 - c. Ecoute active
 - d. Empathie
- 18- Parmi les vitamines suivantes, laquelle est indispensable à l'équilibre nerveux ?
- a. **Vitamine du groupe B**
 - b. Vitamine C
 - c. Vitamine K
 - d. Vitamine A
- 19- L'hallucination est considérée comme étant :
- a. Une imagination débordante
 - b. Une représentation graphique
 - c. **Une perception sans objet**
 - d. Un jugement erroné
- 20- L'anorexie mentale est une pathologie qui se retrouve essentiellement chez :
- a. Le jeune garçon
 - b. L'adulte en âge de procréer
 - c. Le vieillard
 - d. **La jeune fille**
- 21- Parmi les propositions suivantes, laquelle consiste à imiter automatique les actes et les gestes exécutés par d'autres personnes ?
- a. Echolalie
 - b. **Echopraxie**
 - c. Catalepsie
 - d. Dyskinésie

Annales-gésique ! Édition 2018

- 22- Une mobilité excessive au cours de laquelle le patient tourne en rond, s'engage dans un mouvement excessif sans but apparent, avec des activités physiques désordonnées traduit lequel de ces troubles ?
- Hallucination tactile**
 - Schizophrénie catatonique
 - Hypochondrie
 - Dyslexie
- 23- Le patient déprimé refuse de sortir dans son lit. Quelle action doit faire l'infirmière pour l'encourager à sortir ?
- Lui proposer une récompense
 - Lui ordonner de se lever de son lit
 - L'encourager positivement à faire une activité**
 - Le laisser dormir, ne pas le déranger.
- 24- L'infirmière informe la sœur de Mme Remy des effets secondaires de l'électrochoc thérapeutique. Laquelle de ces réponses est correcte ?
- Le patient ne pourra pas respirer après
 - Le traitement n'est pas indiqué pour les patients souffrant de dépression
 - Le patient peut présenter une désorientation et une confusion immédiatement après**
 - Il peut avoir une rétention urinaire après le traitement.
- 25- C'est un trouble déficitaire caractérisé par un défaut permanent et irréversible du développement des facultés intellectuelles interrompues depuis la période intra-utérine ou à un très jeune âge :
- Oligophrénie**
 - Hypomanie
 - Catatonie
 - Hébétéphrénie
- 26- Quel est le traitement le plus efficace pour aider un toxicomane à abandonner la consommation de la drogue ?
- Médicamenteux
 - Biologique
 - Psychologique**
 - Massothérapie
- 27- Une infirmière parle à un schizophrène quand brusquement le patient fixe le plafond. Quelle sera l'attitude de l'infirmière ?
- Arrêter la conversation et recommencer plus tard
 - Demander au patient s'il voit quelque chose au plafond**
 - Continuer la conversation sans accorder une importance à son comportement
 - Dire au patient que tu vois aussi ce qu'il regarde
- 28- La crainte obsessionnelle qu'éprouve un patient à commettre un acte dangereux, soit envers lui-même soit envers les autres est :
- Phobie d'obsession
 - Dymorphobie

- 29- Il est dû à l'action d'une « Censure » qui s'oppose à l'apparition de souvenirs récents afin de protéger l'équilibre émotionnel de l'individu :
- a. Dénie
 - b. Pulsion
 - c. Conflit
 - d. **Refoulement**
- 30- Ce sont des signes cliniques de la dépression excepté :
- a. Baisse de la libido
 - b. Troubles de l'alimentation
 - c. Insomnie du matin
 - d. **Fausse reconnaissance**
- 31- Le patient qui répète les mêmes gestes présente :
- a. Délire
 - b. Cataplexie
 - c. Catatonie
 - d. **Stéréotypie**
- 32- Mme Sauveur souffre d'hallucinations auditives : après un mois de traitement, elle revient à la clinique pour une consultation. Qu'est-ce qui peut prouver à l'infirmière que le médicament était efficace ?
- a. Augmentation du poids du patient
 - b. Capacité de s'asseoir paisiblement de d'attendre le médecin
 - c. **Disparition des voix**
 - d. Le patient a un bon appétit
- 33- Mme Sauveur est diagnostiquée bipolaire, identifiez le médicament de choix dans sa thérapeutique :
- a. Cymbalta
 - b. Modécate
 - c. Lithiocar
 - d. **Quétiapine**
- 34- Après la prise des antidépresseurs, le comportement à surveiller est :
- a. Les troubles de la tension
 - b. Les troubles de la vue
 - c. **L'apparition d'euphorie et de désinhibition**
 - d. Troubles de l'audition
- 35- Mr. Laguerre est diagnostiqué épileptique et reçoit un anticonvulsivant. Que doit surveiller l'infirmière dans sa thérapeutique ?
- a. Une alimentation riche en glucide

- b. Une alimentation pauvre en calorie
 - c. De l'acide folique
 - d. Des protéines
- 36- La forme clinique la plus fréquente de toutes schizophrénie est :
- a. Paranoïde
 - b. Catatonique
 - c. Hébéphrénique
 - d. Simple
- 37- Vous faites une thérapie de groupe pour aider un patient à calmer son anxiété et ses angoisses, vous l'intégrez dans le :
- a. Groupe de crise
 - b. Groupe d'accueil
 - c. Groupe d'écoute musicale
 - d. Groupe psychomotricité
- 38- Chez une jeune accouchée de 6 jours faisant une psychose puerpérale, le médecin lui :
- a. Défendra de voir son bébé, à cause du risque d'infanticide
 - b. Laissera voir son bébé, car c'est dans les premiers moments de la vie, que le bébé a besoin de sa mère
 - c. Permettra d'allaiter son enfant car le lait maternel est meilleur.
 - d. Lui demander de surveiller le bébé
- 39- Les deux règles d'or de l'entretien psychiatrique sont :
- a. Politesse et tact
 - b. Savoir écouter et savoir entendre
 - c. Stabilité de l'humeur et l'art d'écouter
 - d. Attitude pondérée et politesse
- 40- Françoise travaille aux côtés de Georges qu'elle côtoie quotidiennement. Depuis quelques jours, l'idée que ce dernier est son mari s'installe en elle et persiste. Elle essaie vainement de l'éliminer de sa conscience. Elle développe :
- a. Une hystérie
 - b. Une attaque de panique
 - c. Obsession
 - d. Une phobie
- 41- C'est une affection qui se caractérise par des troubles du comportement où le conflit psychique se manifeste par des signes physiques et émotionnels.
- a. Conversion
 - b. Réaction de dépendance
 - c. Trouble de la conscience
 - d. Obsession

CHOISIR L'EXCEPTION