

Simulation de l'examen national des infirmières

Questions à répondre

L'examen est divisé en plusieurs blocs. Prière de bien lire les questions et les instructions.

Bloc Médico Chirurgical

Les questions suivantes evaluent votre connaissance dans le nursing médical et/ou chirurgical

Pour évaluer le score d'Apgar, l'infirmière doit tenir compte des paramètres suivants sauf 5 points

- ☐ Fréquence cardiaque
- ☐ Respiration
- ☐ Coloration
- ☒ Excavation orbitaire
- ☐ Réactivité à la stimulation
- ☐ Tonus Musculaire



A quoi sert le score d'Apgar ?

5 points

- ☒ Permet de mesurer l'état des fonctions vitales d'un nouveau-né
- ☐ Permet d'évaluer de définir la présence de détresse respiratoire
- ☐ Permet de confirmer la présence de malformation congénitale
- ☐ Permet de d'explorer les sphères neurologiques

Les éléments suivants sont des signes de détresse cardiorespiratoire, sauf

5 points

- ☐ Se tenant la poitrine, pale, accompagné de sudoration
- ☐ respiration pénible/dyspnée
- ☐ sifflements, toux
- ☒ ralentissement psychomoteur

Après avoir évalué le niveau de conscience d'un patient présentant les caractéristiques suivantes : Quand il est secoué avec douceur, le patient ouvre les yeux et vous regarde, mais il répond à vos questions de façon lente et un peu confuse. Vous dites qu'il est en ?

5 points

- ☐ Coma
- ☒ Obnubilation
- ☐ Léthargie
- ☐ Aucune des réponses



Un patient est en hypothermie quand sa température corporelle centrale

5 points

- ☐ est au-dessous de 33° Celsius.
- ☐ est au-dessous de 34° Celsius.
- ☐ est au-dessous de 35° Celsius.
- ☒ est au-dessous de 36° Celsius.

L'infirmière utilise fort souvent le terme score de Glasgow dans la rédaction de ses rapports. Ce terme permet

5 points

- ☒ d'évaluer le niveau de conscience d'un patient
- ☐ d'évaluer le tableau clinique d'un patient
- ☐ d'évaluer le pronostic vital d'un patient
- ☐ Aucune de ces réponses

Les cas d'AVP (Accidents de la voie Publique) sont monnaies courantes en Haïti. Les signes suivants parlent en faveur d'atteinte de la moelle épinière sauf

5 points

- ☐ Perte du contrôle vésical (incontinence urinaire)
- ☐ Perte du contrôle des sphincters (incontinence fécale)
- ☐ Paralysie et Lombalgie et sensation de fourmillement
- ☒ Hypertension Artérielle constatée au sphygmomanomètre



Saturometre est un dispositif permettant de calculer

5 points

- ☒ Fréquence cardiaque et saturation d'oxygène
- ☐ Fréquence respiratoire et saturation d'oxygène et de CO2
- ☐ Fréquence cardiaque, saturation d'oxygène et CO2
- ☐ Fréquence, rythme cardiaque et saturation d'oxygène

La complication la plus grave des fractures et luxations de la charnière dorsolombaire est

5 points

- ☐ Lombalgie intense
- ☐ L'atteinte des vaisseaux
- ☒ L'atteinte médullaire
- ☐ Risque d'hémorragie interne

En évaluant l'état de conscience d'un patient, malgré des stimuli douloureux répétés, le patient ne peut être réveillé et il garde les yeux fermés; il ne manifeste aucune réaction a ses propres besoins ni aux stimuli externes. On peut confirmer que ce patient est

5 points

- ☒ En Coma
- ☐ En Obnubilation
- ☐ En Léthargie
- ☐ Décédé



On vous appelle pour un patient présentant une perte complète de connaissance soudaine et brève (jusqu'à 30 minutes environ). Dans le rapport, comme impression clinique vous écrivez

5 points

- ☐ COMA
- ☐ Crise convulsive
- ☒ Syncope
- ☐ Lipothymie
- ☐ Etourdissement

Selon l'OMS, après le triage, les mesures suivantes doivent être adoptées. Trouvez les intrus

5 points

- ☐ CAS URGENTS Nécessitent un traitement d'urgence immédiat
- ☒ CAS URGENTS Nécessitent une évaluation et une attention rapide
- ☐ CAS PRIORITAIRES Nécessitent une évaluation et une attention rapide
- ☒ CAS PRIORITAIRES Nécessitent un traitement d'urgence immédiat
- ☐ CAS NON URGENTS Peuvent rester dans la file d'attente

Un patient Hémophilie saigne

5 points

- ☐ Plus vite et plus fréquemment que la normale
- ☒ Plus longtemps et plus fréquemment que la normale
- ☐ Toutes les réponses sont bonnes
- ☐ Aucune de ces réponses



Pour suspecter un cas d'hypoglycémie, l'infirmière doit maîtriser les signes suivants, excepté

5 points

- ☐ Maux de tête
- ☐ Palpitations cardiaques
- ☐ Vertiges
- ☒ Bradycardie
- ☐ Sueurs froides
- ☐ Pâleur
- ☐ Troubles oculaires

En cas de Cholera, il est de coutume d'administrer beaucoup de soluté aux patients. En cas de surcharge, la complication suivante peut survenir

5 points

- ☐ Hépatomégalie
- ☐ Cardiomégalie
- ☒ Œdème aigu pulmonaire
- ☐ Hémorragie par extravasation



Je reçois les informations en provenance des récepteurs périphériques (douleur, position des membres...) et les renvoie vers le cerveau. Je reçois aussi les informations du cerveau (ordre de mouvement...) et les renvoie vers les muscles. Quand je suis liaisonné(e), cela peut provoquer une paralysie. Je suis :

5 points

- ☐ Le cerveau
- ☐ Le cervelet
- ☐ La moelle osseuse
- ☒ La moelle épinière
- ☐ Le Tronc Cérébral

Dans les fractures des membres inférieurs, les complications les plus fréquentes dont la prévention nécessite un parage anticoagulant sont les suivantes

5 points

- ☐ La raideur et l'infection.
- ☒ La thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire.
- ☐ La thrombose artérielle et l'embolie graisseuse.
- ☐ La thrombose veineuse et l'infection.



Pour administrer un soluté en cas de brûlure, l'infirmière peut utiliser la formule de Parkland, laquelle est connue de la manière suivante

5 points

- ☒ 4.0ml/kg/SB
- ☐ 5.0ml/kg/SB
- ☐ 6.0ml/kg/SB
- ☐ Aucune des réponses

Au cours de la surveillance d'un traumatisé crânien, l'élément majeur reste

5 points

- ☐ Le contrôle de la tension artérielle
- ☐ Le contrôle de la respiration
- ☒ Le contrôle de la conscience
- ☐ Les réflexes
- ☐ Le sommeil

Combien de litres d'oxygène par minutes pouvez-vous administrer au maximum à un patient avec une lunette nasale

5 points

- ☐ 4-6 litres au max
- ☐ Plus de 6 litres
- ☒ 1-3 litres
- ☐ Aucune de ces réponses



Quelle est la valeur normale de saturation en oxygène

5 points

- ☐ 95-98%
- ☐ 94-96%
- ☐ < 90%
- ☒ Aucune de ces réponses

Une occlusion intestinale caractérisée par une torsion d'anse sur elle-même est dite une occlusion par :

5 points

- ☒ Volvulus.
- ☐ Invagination.
- ☐ Adhérence.
- ☐ Hernie interne.
- ☐ Suite opératoire.

La thérapeutique extrêmement urgente en cas de choc comporte d'abord

5 points

- ☐ L'antibiothérapie massive.
- ☐ La sérothérapie antitétanique.
- ☒ La normalisation de la volémie.
- ☐ La normalisation du poids corporel
- ☐ a et c sont bonnes.
- ☐ c et d sont bonnes.



Inflammation du tissu mou avec tendance à la diffusion, intéressant le tissu cellulaire et le tissu interstitiel

5 points

- ☐ Septicémie.
- ☒ Cellulite.
- ☐ Abscess chaud.
- ☐ Phlegmon.

Considérant le cas de Ridley AS et de Christelle AS, donc tous deux porteurs d'un trait de la drépanocytose. Quel pourcentage d'avoir des enfants malades à la première génération

5 points

- ☐ 0%
- ☒ 25%
- ☐ 50%
- ☐ 75%
- ☐ 100%



Dans le cas de l'hémophilie, répondez. Quand le père est malade et que la mère ne l'est pas

5 points

- ☐ Tous les enfants de sexe masculin seront malades
- ☐ Tous les enfants de sexe féminin seront malades
- ☐ 50% des filles et 50% des garçons seront malades
- ☒ 100% des filles seront porteuses
- ☐ 50% des filles et 25% des garçons seront malades

Un patient qui présente une douleur siégée au niveau de la région épigastrique peut avoir les organes/structures suivants affectés sauf

5 points

- ☐ Colon
- ☐ Pancréas
- ☒ Rein droit
- ☐ Estomac
- ☐ Duodénum



Les échanges gazeux réalisées au niveau des poumons prennent le nom de

5 points

- ☐ Hémorragie
- ☐ Hématémèse
- ☐ Hémostase
- ☒ Hématose
- ☐ Hématome

J'achemine le sang oxygéné vers les organes et ramène le sang veineux au cœur. Je suis

5 points

- ☒ La grande Circulation
- ☐ La petite Circulation
- ☐ Les deux
- ☐ Aucune des réponses

Yvette, 68 ans se présente aux urgences avec une hémiplégie droite sur histoire d'hypertension artérielle. Quelle est la partie du cerveau qui est affecté selon vous ?

5 points

- ☐ Hémisphère cérébral droit
- ☒ Hémisphère cérébral gauche
- ☐ Hémisphère cérébelleux droit
- ☐ Hémisphère cérébelleux gauche



Le signe de Babinsky :

5 points

- ☒ Indique une lésion de la voie pyramidale.
- ☐ Signifie un malade en coma qui vomit.
- ☐ Indique une paralysie faciale.
- ☐ Signifie un trouble de la déglutition

Le traitement de la lithiase rénale est le suivant :

5 points

- ☐ Enlever le calcul et traiter la cause.
- ☐ Obtenir une diurèse quotidienne de 1500 à 2000 ml d'urines.
- ☐ Traitement médical :antibiotiques ; ou traitement chirurgical :néphrectomie.
- ☒ Aider la migration spontanée du calcul par diurèse massive et anti-inflammatoires

Il s'agit d'un ramollissement du tissu osseux par défaut d'ossification

5 points

- ☐ Ostéosynthèse.
- ☐ Ostéomyélite.
- ☐ Ostéoporose.
- ☒ Ostéomalacie



Le risque majeur des plaies articulaires reste

5 points

- ☐ L'ankylose.
- ☐ La raideur.
- ☒ L'infection.
- ☐ La pseudarthrose

Les trois signes fonctionnels de l'occlusion intestinale incluent les suivants

5 points

- ☐ Météorisme abdominal, vomissement, arrêt des matières et des gaz.
- ☐ Météorisme abdominal, douleurs abdominales, arrêt des matières et des gaz.
- ☒ Douleurs abdominales, vomissement, arrêt des matières et des gaz.
- ☐ Météorisme abdominal, reflux gastro-oesophagien, arrêt des matières et des gaz.

Lors d'un traumatisme sévère lequel de ces organes est susceptible d'être endommagé en premier

5 points

- ☐ Le foie
- ☐ Les reins
- ☒ La rate
- ☐ La vessie



Le volume de remplacement pour les 24 premières heures pour une victime d'une brûlure avec 20% de surface corporelle brûlée, est calculée par la formule de Packland. Cette formule est 5 points

- ☐ 10 ml/kg/h de DW 5%
- ☐ 10ml/kg/h de Ringer Lactate
- ☐ 8 litres de cristalloïdes sur 24 heures
- ☒ 2-4 ml x % SCB x poids (kg)

Quelle technique d'injection qu'un diabétique doit-il utiliser pour éviter les complications lipodystrophiques? 5 points

- ☐ Aspirer avant d'injecter
- ☒ Assurer la rotation des sites d'injection
- ☐ Injecter dans le tissu musculaire
- ☐ Pincer la peau avant d'injecter

Incapacité à lire ou voir les objets rapprochés 5 points

- ☐ Glaucome
- ☒ Presbytie
- ☐ Myopie



Idéal pour diagnostiquer une infection par un streptocoque 5 points

- ☐ Sang occulte
- ☐ Bilan hépatique
- ☐ Bilan ou profile lipidique
- ☒ ASO ou ASLO

Le diaphragme s'abaisse au cours de 5 points

- ☐ L'expiration
- ☒ L'inspiration
- ☐ Les deux
- ☐ Aucune des réponses

Une destruction de la cellule bêta du pancréas conduit à 5 points

- ☒ Diabète du type 1 ou insulino dépendant
- ☐ Diabète requérant
- ☐ Diabète gestationnel
- ☐ Diabète non insulino dépendant



Quelle est en moyenne la quantité d'eau à boire chaque jour ?

5 points

- ☐ 0.5 litre
- ☐ 1 litre
- ☒ 1.5 litre

Le pigment qui colore le sang s'appelle

5 points

- ☐ Hématose
- ☐ Bilirubine
- ☒ Hémoglobine
- ☐ Diastase

L'effet secondaire des antalgiques est

5 points

- ☐ Diarrhée
- ☐ Vomissement
- ☒ Constipation
- ☐ Nausées



Quel agent causal est responsable de la Gale

5 points

- ☐ Herpès simplex
- ☐ Staphylocoque
- ☒ Sarcoptes scabiei
- ☐ Treponema pallidum

Quel agent causal est responsable du Furoncle

5 points

- ☐ Herpès simplex
- ☒ Staphylocoque
- ☐ Sarcoptes scabiei
- ☐ Treponema pallidum

Les sujets du groupe Sanguin B

5 points

- ☒ Possèdent antigène B et anticorps naturel anti-A
- ☐ Possèdent antigène A et anticorps naturel anti-B
- ☐ Ne possèdent aucun antigène et ont les anticorps naturels anti-A et anti-B
- ☐ Ne possèdent antigène A et B et aucun anticorps



Les sujets du groupe O

5 points

- ☐ Possèdent antigène B et anticorps naturel anti-A
- ☐ Possèdent antigène A et anticorps naturel anti-B
- ☒ Ne possèdent aucun antigène et ont les anticorps naturels anti-A et anti-B
- ☐ Ne possèdent antigène A et B et aucun anticorps

Bloc Santé Materno Infantile



Les questions suivantes sont en rapport avec la santé de la mère et de l'enfant

La ligature des trompes prévient la grossesse

5 points

- ☐ En arrêtant la migration
- ☐ En détruisant le produit de la conception
- ☒ En empêchant la fécondation
- ☐ En empêchant la nidation

Dans le cadre du développement normal du bébé il quadruple son poids à

5 points

- ☐ 12 mois
- ☒ 24 mois
- ☐ 36 mois
- ☐ 48 mois



La respiration, la diurèse et les reflexes ostéo-tendineux sont les éléments à surveiller avec l'administration de

5 points

- ☐ Ampicilline
- ☐ Ocytocine
- ☐ Hydralazine
- ☒ Sulfate de magnésium

Un nouveau né dont la température est de 35.5 C est en

5 points

- ☐ Hyperthermie
- ☐ Normothermie
- ☒ Hypothermie
- ☐ Hyperglycémie

Le nombre de visites prénatales recommandé pour une grossesse normal est de

5 points

- ☐ 3 visites
- ☒ 4 visites
- ☐ 2 visites
- ☐ 1 visite



Ertha est prise en charge et l'accouchement a lieu à 2 heures après l'admission. Lequel de ces items serait le premier geste de l'infirmière se rapportant aux soins à donner au nouveau né ?

5 points

- ☐ Habiller l'enfant
- ☐ Prendre le poids et la taille
- ☐ Réaliser les soins du cordon
- ☒ Faire la désobstruction des choanes

L'infirmière mesure le poids à la naissance, l'enfant pèse 3,6 Kg, deux jours après, on observe une perte de poids dit physiologique représentant une valeur

5 points

- ☐ Inférieure à 5%
- ☐ Supérieure à 10%
- ☒ Inférieure ou égale à 10%

Pourquoi conseille-t-on d'allaiter l'enfant dès la naissance ?

5 points

- ☐ Cela initie le reflexe de la succion
- ☒ Cela stimule la production du lait
- ☐ Cela soulage l'engorgement des seins
- ☐ Cela permet d'éliminer l'excès de mucosités



La meilleure façon de prévenir l'engorgement est de

5 points

- ☒ Donner le sein souvent la nuit
- ☐ Faire vider le plus souvent que possible par le nourrisson
- ☐ Donner le sein aussitôt que possible
- ☐ Maintenir les seins au sec et propre

Anita une fillette de 2ans pesant 10kg 500, vue pour plaintes, fièvre de 38C et elle pousse des cris à la pression de l'oreille droite. Le pédiatre retient le diagnostic de l'otite de l'oreille droite. Il prescrit ampicilline injectable 500mg/kg de poids q 6 heures. Quelle est la quantité à lui administrer par dose ?

5 points

- ☐ 500mg/dose
- ☐ 1mg/dose
- ☒ 525mg/dose
- ☐ 750kg/dose

Lequel de ces items est une contre indication à l'épisiotomie

5 points

- ☐ Périnée lâche
- ☐ Application de forceps
- ☒ Varices vulvaires et vaginales
- ☐ Condylomes multiples vaginaux et vulvaires



Parmi ces maladies suivantes de la mère, laquelle est plus nocive pour le fœtus ? 5 points

- ☐ Malaria
- ☐ Bronchopneumonie
- ☒ Rubéole
- ☐ Varicelle

Mr et madame Loulou sont Rh négatif. Les risques pour que leurs enfants souffrent d'érythroblastose fœtal sont de l'ordre de : 5 points

- ☒ 0%
- ☐ 25%
- ☐ 50%
- ☐ 100%

Le premier trimestre de la grossesse est la période la plus critique pour les risques de 5 points

- ☐ Mutagènes
- ☐ De syndrome néphrotique
- ☒ Tératogène
- ☐ Métabolique



Un saignement abondant et une dilatation du col chez une femme enceinte indique 5 points

- ☐ Une menace d'avortement
- ☒ Un avortement inévitable
- ☐ Une infection pelvienne
- ☐ Abruptio placentae

Le bébé prématuré développe souvent de la détresse respiratoire parce que, excepté : 5 points

- ☐ L'alvéole est immature et ne produit pas assez de surfactant
- ☒ Le bébé prématuré n'a pas reçu assez d'anticorps de sa mère
- ☐ Les nerfs et le centre respiratoire sont immatures
- ☐ La cage thoracique et le muscle respiratoire sont faibles

Cette substance est particulièrement toxique pour les femmes enceintes, allaitantes et les jeunes enfants 5 points

- ☐ Iode
- ☒ Méthylmercure
- ☐ Molybdène
- ☐ Sélénium



Yvrose âgée de 27 ans G2P1 a eu ses dernières règles le 26 décembre 2013. Elle est Rhésus négatif et son mari qui est aussi père de son premier enfant et Rhésus positif. Le premier né est Rhésus positif. La première grosse n'ayant pas été suivie, aucune mesure particulière n'a été prise. La date probable de l'accouchement est :

5 points

- ☐ 27 aout 2014
- ☐ 3 septembre 2014
- ☒ 3 octobre 2014
- ☐ 6 aout 2014

Le bébé d'Yvrose court les risques cités ci-dessous, sauf

5 points

- ☐ L'anarsaque foteo placentaire
- ☒ La polycytemie
- ☐ L'ictère nucléaire
- ☐ La splénomégalie

Le poids normal du nouveau né doit être

5 points

- ☐ Inférieur à 2.5kg
- ☐ Inférieur ou égale à 2.5kg
- ☐ Supérieur à 2.5kg
- ☒ Supérieur ou égal à 2.5kg



Les signes d'une mauvaise tolérance gastrique sont, excepté :

5 points

- ☐ Ballonnement abdominale
- ☒ Hyperthermie de 40°C
- ☐ Régurgitation
- ☐ Vomissement

Sont les indications d'utilisation du spéculum, sauf

5 points

- ☐ Examen du col
- ☒ Infections périnéales
- ☐ Prélèvements de sécrétions vaginales et cervicales

De la puberté à la ménopause le milieu vaginal est normalement

5 points

- ☐ Basique
- ☒ Acide
- ☐ Alcalin

La fermeture prématurée des sutures craniennes chez le bébé s'appelle

5 points

- ☐ Chevauchement
- ☒ Craniosténose
- ☐ Plagiocéphalie



Un cycle menstruel anormalement court

5 points

- ☐ Aménorrhée
- ☒ Hypoménorrhée
- ☐ Polyménorrhée

L'auto examen des seins se fait :

5 points

- ☒ Chaque mois
- ☐ Tous les 3mois
- ☐ Tous les 6 mois

La dysménorrhée secondaire est consécutive a l'exception de

5 points

- ☐ Trouble gynécologique
- ☐ Endométriose
- ☐ Tumeur pelvipéritonite
- ☒ Cycle ovulatoire

Un fibrome est :

5 points

- ☐ Un cancer de l'ovaire
- ☒ Une tumeur formée par les tissus fibreux
- ☐ Un cancer de l'utérus
- ☐ Une distension abdominale



La sécrétion du lait maternel dépend de tout ce qui suit, sauf

5 points

- ☒ L'hormone de croissance
- ☐ L'hormone de lactogène
- ☐ L'hormone ocytocine
- ☐ Une bonne succion

Les enfants nés entre 37ème et 42ème semaines de grossesse sont des

5 points

- ☐ Prématurés
- ☒ Nouveau né à terme
- ☐ Post mature

L'acide aminé le plus particulièrement rencontré dans le lait maternel

5 points

- ☐ Leucine
- ☒ Isoleucine
- ☐ Phénylalanine

Masque de grossesse est encore appelé

5 points

- ☐ Vergetures
- ☒ Chloasma
- ☐ Linea nigra



La période s'écoulant entre le début du travail de la naissance à la délivrance est

5 points

- ☐ Avortement
- ☒ Intra-partum
- ☐ Ante-partum

La présence de tissu endométrial en dehors de l'endomètre

5 points

- ☐ Vaginose
- ☐ Candidose
- ☒ Endométriose
- ☐ Aucune des réponses

Les facteurs suivants peuventt contribuer au travail précipité, à l'exception de

5 points

- ☐ Multiparité
- ☐ Gros bassin
- ☐ Contractions utérines puissantes
- ☒ Déchirure du col



On dit travail prolongé lorsqu'il dure plus de

5 points

- ☒ 24 hrs
- ☐ 30 hrs
- ☐ 72 hrs
- ☐ 48 hrs

Les signes alarmants pendant le post-op d'une parturiente sont, excepté 5 points

- ☐ Hypotension
- ☐ Atonie utérine
- ☐ Tachycardie
- ☒ Lochies

Les conséquences possibles de la macrosomie fœtal pour la mère sont, sauf 5 points

- ☐ Risque de disproportion foeto pelvienne
- ☐ Déchirure des tissus mous pendant l'accouchement
- ☐ Risque de travail dystocique
- ☒ Traumatisme crânien



Lequel de ces bassins ne permettent pas l'accouchement par voie vaginale ? 5 points

- ☐ Le bassin gynécoïde
- ☐ Le bassin androïde
- ☒ Le bassin anthropoïde

Petites excroissances verruqueuses sur la vulve, les lèvres, le col, les parois et le rectum 5 points

- ☐ Condylomes acumines
- ☐ Herpes virus
- ☒ Condyloma lata
- ☐ Chancre mou

Lors de la formation des membranes embryonnaires, celle qui se forme la première est 5 points

- ☒ Le chorion
- ☐ L'amnios
- ☐ La cavité amniotique
- ☐ Les villosités choriales



L'amnios est une membrane embryonnaire qui prend naissance dans la courbe superficielle du :

5 points

- ☒ Ectoblaste
- ☐ Mésoblaste
- ☐ Throphoblaste

Une femme enceinte qui a le cytomégalovirus peut le transmettre au fœtus par

5 points

- ☐ Le placenta
- ☐ La voie cervicale pendant l'accouchement
- ☐ Pendant l'allaitement
- ☐ a et c son vrais
- ☒ a et b sont vrais

On considère comme dystocique les présentations exceptées :

5 points

- ☐ Siège
- ☐ Épaule
- ☐ Front
- ☒ Céphalique



C'est une hormone protéique qui stimule la lactation

5 points

- ☒ Prolactine
- ☐ L'ocytocine
- ☐ L'ADH

Un nourrisson se situe entre

5 points

- ☐ 0 à 3 mois
- ☒ 3 mois à 1 an
- ☐ 9 mois à 2 ans

L'hormone provenant du corps jaune de l'ovaire

5 points

- ☐ Oestrogène
- ☒ Progestérone
- ☐ Chromosome

L'amniocentèse se réalise à partir du

5 points

- ☐ 10ème semaine d'aménorrhée
- ☐ 18ème semaine d'aménorrhée
- ☒ 17ème semaine d'aménorrhée



L'étude du liquide amniotique permet de :

5 points

- ☐ Faire le caryotype de l'enfant
- ☐ Connaître son sexe
- ☐ Dépister certaines maladies chromosomiques ou génétiques
- ☒ Toutes les réponses sont vraies

Une femme après son accouchement présente une atonie utérine, quel geste doit faire l'infirmière? 5 points

- ☐ Appeler le médecin
- ☒ Pratiquer un massage utérin
- ☐ Placer une perfusion

Bloc Santé Communautaire



Les questions suivantes évaluent votre connaissance sur l'approche communautaire de la santé.

Est un domaine propice à la promotion de la santé

5 points

- ☐ Renforcement de l'action communautaire
- ☐ Elaboration de politique publique saine
- ☐ Réorientation des services de santé
- ☐ a et b sont bonnes
- ☐ b et c sont bonnes
- ☒ Toutes les réponses sont bonnes



Selon la théorie d'apprentissage social, le facteur le plus important du changement de comportement est :

5 points

- ☐ Le déterminisme réciproque
- ☐ L'apprentissage par observation
- ☐ Les attentes
- ☒ La connaissance de ses propres capacités

La principale valeur que doit cultiver un comité exécutif communautaire est

5 points

- ☐ La courtoisie
- ☐ L'éloquence
- ☐ Le courage
- ☒ La transparence

La constitution haïtienne veut que le système national de santé soit

5 points

- ☐ Concentré
- ☐ Déconcentré
- ☐ Centralisé
- ☒ Décentralisé



Sont les vaccins les plus sensibles à la chaleur, excepté

5 points

- ☐ BCG
- ☐ Anti polio
- ☒ Pentavalent
- ☐ RR

L'incidence de la tuberculose en Haïti est de

5 points

- ☐ 328/100.000
- ☐ 2.2%
- ☒ 238/100.000
- ☐ 23%

Au 5ème mois de traitement, vous constatez que les crachats de madame Robert sont encore positifs, vous concluez que c'est un cas de

5 points

- ☐ Rechute
- ☒ Echec de traitement
- ☐ MDR- TB
- ☐ Abandon



Le programme de vaccination fut créé en Haïti en :

5 points

- ☐ 1978
- ☐ 1974
- ☒ 1979
- ☐ 1986

Est une structure de soins au niveau 3

5 points

- ☐ Hôpital universitaire
- ☐ Hôpital départemental
- ☐ Hôpital spécialisé
- ☐ a et b sont bonnes
- ☒ a et c sont bonnes
- ☐ b et c sont bonnes
- ☐ Toutes les réponses sont bonnes

Le paquet essentiel de services doit, excepté :

5 points

- ☐ Répondre aux problèmes de santé prioritaires
- ☐ Être justifiable d'interventions
- ☐ Satisfaire les besoins en santé de façon intégrée et équitable
- ☒ Couvrir tous les problèmes de santé



14 points

	Vrai	Faux
Les pilules contraceptives sont contre indiquées chez toutes jeune filles qui n'ont pas encore d'enfant	☐	☒
En Haïti comme au niveau mondial, le virus du SIDA prédominant est le VIH 1	☒	☐
Il est important de garder le patient tuberculeux qui suit son traitement anti tuberculeux en isolement dans un coin afin qu' il ne transmette pas la maladie	☐	☒
Un Mantoux test négatif signifie inévitablement l'existence d'une maladie tuberculeuse active	☐	☒
Administré à 9 mois le vaccin anti rougeoleux donne une protection de 85- 90%	☒	☐
Le VIH symptomatique est une contre indication au vaccin BCG	☒	☐
L'environnement social d'un individu influence grandement son comportement	☒	☐

C'est un signe du tétanos néonatal

5 points

- ☐ Diarrhee
- ☒ Arrêt de téter
- ☐ Paleur



Les principales causes de mortalité infantile dans les pays en voie de développement sont 5 points

- ☐ Rougeole, fièvre, bronchiolite
- ☒ Pneumonie, diarrhée, rougeole
- ☐ Malaria, diarrhée, méningite
- ☐ Diarrhée, anémie, malnutrition

Le vaccin polio 0 doit être donné de 5 points

- ☐ 0 à 30 jours
- ☐ 0 à 20 jours
- ☒ 0 à 15 jours

Jacqueline a mis au monde un bébé qui vient de recevoir le vaccin BCG, l'enfant n'a aucune cicatrice au site d'injection. L'infirmière doit répéter la dose dans 5 points

- ☐ 2 mois
- ☐ 4 mois
- ☒ 6 mois
- ☐ 9 mois



Le dépistage volontaire dans le cadre du programme VIH/SIDA est

5 points

- ☐ Une méthode diagnostic
- ☐ Une méthode d'investigation
- ☒ Une méthode préventive

Quel est le premier test qui permet de faire le dépistage rapide du VIH

5 points

- ☐ Oraquick
- ☐ Capillus
- ☐ Elisa
- ☒ Détermine

Le moteur de toute action communautaire est

5 points

- ☐ Le responsable du centre
- ☐ Le représentant de l'état
- ☒ La participation des membres de la communauté
- ☐ La participation des ONG internationales



En présence d'un patient sourd-muet, l'infirmière en charge utilisera les moyens de communication suivants, excepté 0 point

- ☐ L'expression faciale
- ☐ Le toucher
- ☐ Hochement de la tête
- ☒ Haussement de la voix

Les facteurs exogènes qui peuvent modifier le comportement d'un individu sont, excepté 5 points

- ☐ La culture
- ☒ Le sexe et l'âge
- ☐ La famille
- ☐ Les groupes de références

Sont applicables à l'hôpital universitaire, excepté 5 points

- ☒ Rôle de premier recours
- ☐ Référence nationale
- ☐ Rôle de formation
- ☐ Rôle de recherche



Sont des vaccins qui ne doivent jamais être congelés, excepté

5 points

- ☐ Rotavirus
- ☐ Pentavalent
- ☐ dT
- ☒ Anti Polio

Ces maladies peuvent être transmises de la mère à l'enfant, excepté

5 points

- ☒ La candidose vaginale
- ☐ La varicelle
- ☐ La diphtérie
- ☐ La chlamydiae

Ce sont des objectifs du counseling dans la clinique prénatale, sauf

5 points

- ☐ Faire le choix judicieux d'une méthode de contraception
- ☐ Mieux comprendre la méthode choisie
- ☐ Encourager un comportement vis-a-vis des IST
- ☒ Empêcher la survenue d'une grossesse gémellaire



Ce sont des mesures préventives contre le Sida, sauf

5 points

- ☐ Utiliser un préservatif
- ☐ Limiter le nombre de partenaires sexuels
- ☐ Vendre librement les seringues à usage unique
- ☒ Utiliser le diaphragme

Sont les valeurs qui régissent notre politique nationale de santé, sauf

5 points

- ☐ Le droit à la vie et à la santé
- ☐ L'efficience
- ☐ La solidarité et la participation citoyenne
- ☒ L'autoritarisme

Les relations existant entre les autorités hiérarchiques et les cadres techniques en fonctions de leurs postes de travail s'élaborent du point de vue graphique à travers

5 points

- ☐ Une description de tâche
- ☐ Une liaison entre les postes de travail
- ☒ Un organigramme
- ☐ Une organisation structurée



Les contraceptifs oraux combinés (COC) se présente sous forme de plaquettes de 5 points

- ☐ 28 pilules hormonales
- ☐ 21 pilules hormonales puis 7 pilules non hormonales
- ☐ 21 pilules hormonales seulement
- ☐ a et b
- ☐ a et c
- ☒ b et c

Sont les vaccins lyophilisés du PEV 5 points

- ☐ BCG et anti polio
- ☐ BCG et pentavalent
- ☒ BCG et RR
- ☐ Anti polio et RR

Choisis la mauvaise réponse. Par rapport au pyramide sanitaire, l'UCS/ UAS est gestionnaire du système national de santé comme 5 points

- ☐ Une politique décentralisée
- ☐ Un programme de réorganisation du système
- ☐ Une stratégie de prestation et de couverture
- ☒ Une politique de santé de tous les pays du monde



Le paquet essentiel de services permet de, sauf

5 points

- ☐ Assurer une meilleure prise en charge des patients
- ☐ Offrir une gamme de services à la population
- ☐ Faire un meilleur choix de médicaments essentiels
- ☒ Gérer le programme de santé

La pierre angulaire du processus de décentralisation du système de santé est représentée par

5 points

- ☐ Le MSPP
- ☐ HUEH
- ☒ L'unité communale de santé

En cas d'AES, quel est l'ARV qui ne doit jamais être utilisé

5 points

- ☐ Indinavir
- ☒ Névirapine
- ☐ Ritonavir
- ☐ Abacavir



Le Jadelle comme implant cutané

5 points

- ☐ Est efficace pendant 5 ans
- ☐ Est efficace pendant 2 ans
- ☐ Comporte 2 bâtonnets
- ☒ a et c
- ☐ a et d

Au cours d'une respiration normale, le nombre de particules projetées autour du malade tuberculeux est faible ; par contre, un effort de toux projette jusqu'à

5 points

- ☐ 1000 particules
- ☒ 3500 particules
- ☐ 2500 particules
- ☐ 1500 particules

L'examen qui peut poser avec certitude le diagnostic de la tuberculose est

5 points

- ☐ X-ray
- ☐ Bacilloscopie
- ☒ Culture
- ☐ RPR



Déterminer parmi les points suivants, celui qui représente l'étape clé de la planification d'actions sanitaires 5 points

- ☐ Etablissement de la liste des problèmes de santé
- ☐ Prise de conscience par les professionnels
- ☒ Définition des priorités
- ☐ Participation de la communauté

12 points

	Vrai	Faux
Toute population est une collectivité	☐	☒
Toute communauté est une population	☒	☐
Le niveau de motivation pour le changement de comportement chez chaque personne est identique	☐	☒
Il existe 3 principaux modes de transmission du VIH	☒	☐
Il est impératif de donner du Fer folate ou des multi vitamines chez une femme placée sous COC	☐	☒
De toutes les formes de tuberculose, la tuberculose pulmonaire représente 23%	☐	☒

Bloc Santé Mentale

Les questions suivantes sont en rapport avec la santé mentale (psychiatrie, psychologie...)



Madame Jules reçoit du Majeptil, le nom chimique de ce médicament est

5 points

- ☐ Levomeprazine
- ☐ Trifluoperazine
- ☐ Chlodiazoperazine
- ☒ Thioproperazine

Jonas reçoit de l'Activan pour son anxiété qui se traduit par les signes suivants. Lequel n'en fait pas partie?

5 points

- ☐ Tension
- ☐ Méfiance
- ☒ Nausée
- ☐ Inquiétude



Vrai ou Faux

7 points

	Vrai	Faux
Le zoloff et l'affecor sont de antidepresseurs ancienne génération	☐	☒
Le syndrome de Korsakoff est causé par une carence en vitamine B12	☐	☒
L'insuffisance coronarienne, l'hypertension et le diabète sont les contre indications du cure de Sakel	☒	☐
Quand le patient rentre en coma insulinique, il peut présenter des crises épileptiques	☒	☐
La ludothérapie est le traitement par l'utilisation des activités manuelles	☐	☒
En cas de surdosage au benzodiazépine l'antidote est le Flumazenil	☒	☐
L'usage prolongé des anxiolitiques provoque une dépendance	☒	☐
Les anxiolitiques ont un effet de sédation et de relaxation musculaire	☒	☐

Le déni est une forme de rejet de

5 points

- ☐ Son entourage
- ☐ Du surmoi
- ☒ Évènement vivant
- ☐ Sa pensée



Le but de la psychologie est de

5 points

- ☐ Décrire
- ☐ Stimuler
- ☒ Comprendre
- ☐ Prédire

En psychiatrie l'aménorrhée est un symptôme qui fait penser à

5 points

- ☐ Un fibrome utérin
- ☐ Une ménopause précoce
- ☐ Une grossesse ectopique
- ☒ Un effet secondaire des médicaments

Pour mieux comprendre le client psychiatrique l'infirmière doit avoir

5 points

- ☐ De la gentillesse
- ☐ Beaucoup de tact
- ☒ Une attitude objective
- ☐ Une technique protective



En présence d'une overdose, l'infirmière doit

5 points

- ☐ Utiliser des moyens de contention
- ☒ Evaluer constamment le niveau de conscience
- ☐ Installer le patient dans la position de Trendelenburg
- ☐ Reconnaître que l'overdose est un problème médical courant

Le traitement de l'épilepsie doit être

5 points

- ☐ Sporadique
- ☒ Continu
- ☐ Intermittent
- ☐ Semi permanent

L'appellation donnée à l'énergie des pulsions qui trouvent leur origine dans le « ça » est

5 points

- ☐ Coït
- ☒ Libido
- ☐ Masturbation
- ☐ Principe du plaisir



La chlorpromazine est efficace dans les

5 points

- ☐ Névroses
- ☒ Psychoses
- ☐ Troubles de la mémoire
- ☐ Troubles de la personnalité

Magda se présente à une clinique psychiatrique accompagné de son frère. A l'admission la patiente est hyperactive, porte des vêtements excentriques et dit qu'elle est la femme du président Obama. Elle se vante d'avoir beaucoup d'argent. Dans sa conversation, elle passe d'une idée à l'autre sans développer chaque idée jusqu'au bout. Identifier la pathologie de la patiente

5 points

- ☒ Schizophrénie paranoïde
- ☐ Bipolaire (phase maniaque)
- ☐ Bipolaire (phase dépressive)

Magda est placée sous traitement, lequel des médicaments suivants, le médecin prescrira pour traiter la patiente ?

5 points

- ☐ Activan 1co le soir
- ☐ Stertaline 1 Co BID
- ☐ Lithium 1Co BID
- ☒ Mellaril 1 Co BID



Mirlène qui habite le quartier de martissant, travaille comme servante chez un sénateur très connu du pays. Elle raconte à ses amis que le sénateur est amoureux d'elle et que c'est elle qui refuse les avances du sénateur. Elle souffre de

5 points

- ☐ Potomanie
- ☐ Mégalomanie
- ☒ Erotomanie
- ☐ Hyperhédonie

Ce facteur organique peut entraîner une maladie mentale

5 points

- ☐ Une dysphagie
- ☒ Une tumeur cérébrale
- ☐ Un pyrosis
- ☐ Une dysménorrhée

C'est un critère moins social de débilité légère ou moyenne

5 points

- ☐ Quotient intellectuel situé entre 50 et 80
- ☐ Quotient intellectuel situé entre 75 et 85
- ☒ Incapacité d'organiser une existence indépendante
- ☐ Incapacité de suivre la scolarité des enfants de même sexe



Parmi ces items, on retrouve les effets secondaires des neuroleptiques, à l'exception de

5 points

- ☐ Aménorrhée
- ☐ Gynécomastie
- ☒ Hyperthyroïdie
- ☐ Prise de poids

La perte de la mémoire des faits récents est la plus significative modification des aptitudes

5 points

- ☒ Des vieillards
- ☐ Des adultes âgés de 40 ans
- ☐ Des adolescents

Le type de personnalité de ceux qui prennent de l'alcool comme moyen d'ajustement à la société est décrit par

5 points

- ☐ Une morale inadéquate
- ☐ Des idées de supériorité
- ☒ L'immaturité émotionnelle
- ☐ Une personne très autoritaire



La phobie est :

5 points

- ☒ Une peur injustifiée et incontrôlable d'un objet
- ☐ Une dépression anxieuse
- ☐ Un symptôme d'expression
- ☐ Une peur permanente d'objet

En psychiatrie les neuroleptiques sont utilisés pour leur effet

5 points

- ☐ Antalgique
- ☒ Sédatif
- ☐ Inducteur du sommeil
- ☐ Hypothermisant

L'Ativan est un

5 points

- ☒ Anxiolytique
- ☐ Antidépresseur
- ☐ Antiparkinsonien
- ☐ Antipsychotique



Un père qui administre une fessée à son fils et lui rapporte un cadeau le lendemain. Il s'agit de 5 points

- ☐ La compensation
- ☐ La projection
- ☒ L'annulation
- ☐ La sublimation

Pour partager la souffrance d'un malade, l'infirmière doit 5 points

- ☐ Eviter de se poudrer
- ☐ Pleurer avec le malade
- ☐ Avoir un visage rayonnant
- ☒ S'intéresser aux problèmes du malade

C'est le risque majeur de la dépression 5 points

- ☒ Le suicide
- ☐ Le chantage
- ☐ Le marchandage
- ☐ L'anorexie



Les tranquillisants sont

5 points

- ☒ Psycholeptiques
- ☐ Psychoanaleptiques
- ☐ Psychodysleptiques

Le couple qui se dispute et le mari frappe dans sa rage une porte plutôt que sa femme, il fait

5 points

- ☐ La rationalisation
- ☐ La régression
- ☒ Le déplacement
- ☐ L'introjection

Compléter. L'akineton est un

5 points

antiparkinsonien, anticholinergique, cor

Compléter. Un exemple de psychotrope qui ne se présente pas sous la forme injectable est...

5 points

Mellaril ou Melleril

Compléter. Une personne qui dépend de l'alcool est un...

5 points

Alcoolique, Toxicomane



Donner deux exemples de tranquillisants majeurs ou neuroleptiques retards

5 points

Le clopixon retard et le Fluanxol retard

Quel médicament utilise-t-on dans la posture des héroïnes?

5 points

Le chlorhydrate de méthadone

Ce sont les symptômes de la manie

5 points

- ☐ Euphorie, logorrhée
- ☐ Les fuites d'idées
- ☐ La désinhibition sexuelle
- ☒ Toute les réponses sont bonnes

Il faut éviter la consommation de lithium au cours du 1er trimestre de grossesse en raison du risque de

5 points

- ☐ Avortement
- ☒ Malformation congénitale
- ☐ Les deux



Les premiers signes de toxicité du lithium sont parfois

5 points

- ☒ Crise convulsive ou un collapsus cardio-vasculaire
- ☐ Crise épileptique
- ☐ Crise d'angoisse

Une psychose métabolique peut être due à

5 points

- ☐ Des lésions vasculaires
- ☐ Une carence d'enzyme et de vitamine
- ☐ Des tumeurs qui peuvent métastasiées
- ☒ Toutes les réponses

Quel est le mécanisme du «moi» mis en jeu dans l'hystérie

5 points

- ☐ Projection
- ☒ Conversion
- ☐ Sublimation

La maladie d'Alzheimer est

5 points

- ☐ Une névrose
- ☐ Une psychose
- ☒ Une démence pré-senile



Sont des causes exogènes de l'arriération mentale

5 points

- ☐ Médicaments absorbables par la mère pendant la grossesse
- ☐ Chute de la mère
- ☒ Les accidents tels rayon X

Sont les causes prénatales de l'arriération mentale sauf

5 points

- ☐ Anoxies fœtal
- ☐ Traumatisme pendant la grossesse
- ☒ Prise de forceps
- ☐ ACV

Pour transformer son existence il faut, sauf

5 points

- ☐ L'enthousiasme
- ☐ L'idéal
- ☐ La volonté
- ☒ Beaucoup d'argent
- ☐ La santé physique
- ☐ La santé psychique



La psychanalyse se définit comme

5 points

- ☐ Science de la conscience
- ☐ Science de l'inconscience
- ☒ Science du subconscient

Citez deux buts de l'admission en psychiatrie

5 points

Offrir au patient un milieu où il peut mieux

Offrir au patient un milieu où il peut mieux s'exprimer, Offrir un traitement médical plus rapproché, Protéger le patient contre son entourage et vice versa, Permettre l'éducation et la réinsertion sociale du patient

Page 2 sur 2

RETOUR**ENVOYER**

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. [Signaler un cas d'utilisation abusive](#) - [Conditions d'utilisation](#) - [Règles de confidentialité](#)

Google Forms

